



دانشگاه گنبد کاووس
نشریه "حفاظت زیست بوم گیاهان"
دوره نهم، شماره هجدهم

<http://pec.gonbad.ac.ir>

علمی-پژوهشی

بررسی کورولوژی، شکل زیستی و ترکیب گونه‌ای عناصر گیاهی مراتع (مطالعه موردی: دامنه‌های جنوبی کوه گرمه ملایر، همدان)

بختیار فتاحی^{۱*}، مائده قربان‌پور دلیوند^۲، بشری گرگانی^۳ و فاطمه قاسمی حاجی آبادی^۴

^۱ استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر

^۲ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

ساری

^۳ دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه ملایر، ملایر

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۹

چکیده

فلور هر منطقه در نتیجه پاسخ‌های زیستی گیاهان به شرایط فعلی و تکامل و سازش گیاهان از گذشته تاکنون می‌باشد. گیاهان از اصلی‌ترین ارکان اکوسیستم‌ها هستند و شناسایی علمی آن‌ها در ارتباط با محیط رویشی‌شان اهمیت کاربردی بسیار زیادی دارد. مطالعه حاضر با هدف معرفی شکل زیستی و ترکیب گونه‌ای عناصر گیاهی در دامنه‌های جنوبی مراتع کوه گرمه ملایر در استان همدان در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ صورت گرفته است. طی بازدید و پیمایش‌های صحرایی، گونه‌های گیاهی عکس‌برداری، جمع‌آوری و به شناسایی کلیه گونه‌های گیاهی موجود در منطقه مورد مطالعه اقدام شد و در مجموع تعداد ۱۶۷ گونه گیاهی در منطقه شناسایی شد. این گونه‌ها متعلق به ۲۴ تیره و ۱۱۴ جنس گیاهی هستند. در بین این گیاهان تیره‌های Compositae با ۳۳، Leguminosae با ۲۲ و Graminae با ۱۸ گونه از بیشترین تنوع برخوردار می‌باشند. کورولوژی گونه‌ها نیز نشان داد که فراوان‌ترین عنصر رویشی در منطقه به‌ترتیب مربوط به مدیترانه‌ای-ایران تورانی (۳۷٪)، ایران تورانی-بومی (۲۸٪) و مدیترانه‌ای و

*نویسنده مسئول: fattahi_b@yahoo.com

نیز اروپا سبیری (۲۲٪) است. همچنین طبقه‌بندی گیاهان براساس شکل زیستی رانکایر نشان داد که تروفیت دارای ۶۹ گونه، کامفیت ۴۷ گونه، کریپتوفیت ۹ گونه و همی کریپتوفیت ۴۲ گونه بودند. بیش‌ترین گیاهان منطقه تروفیت‌ها می‌باشند که حاکی از تخریب صورت گرفته در این اراضی است. سهم بیشتر گیاهان شناسایی شده در منطقه به لحاظ کارکرد به ترتیب علوفه‌ای، حیات وحش و تنوع زیستی بود؛ همچنین گونه‌های چندساله بیشترین توزیع را در منطقه داشتند. بررسی فلورستیک گیاهان هر ناحیه از نظر شناخت تنوع زیستی و مدیریت منابع طبیعی حائز اهمیت است؛ زیرا یکی از مهمترین روش‌ها جهت شناخت ظرفیت، مدیریت، حفاظت از ذخایر تنوع زیستی و حفظ ژنتیک گیاهان آسیب پذیر، بررسی فلور می‌باشد که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را برای شناخت، درک و مدیریت موثرتر ویژگی‌های طبیعی این عرصه‌ها فراهم آورد.

واژه‌های کلیدی: ترکیب گیاهی، کارکرد گونه‌ای، کورولوژی، طبقه بندی رانکایر

مقدمه

شکل زیستی هر گونه گیاهی ویژگی‌هایی است که آن گونه بر اساس سازش و انطباق با محیط از خود بروز می‌دهد (نقی‌نژاد و همکاران، ۱۳۹۴). اشکال زیستی نشانگر سازش‌های ریختی گونه‌ها نسبت به شرایط اقلیمی، خاکی، زیستی و در نهایت اکولوژیکی یک رویشگاه می‌باشد (Archibold, ۱۹۹۵). تفاوت شکل زیستی در جوامع مختلف گیاهی اساس ساختار آن‌ها را تشکیل می‌دهد. کورولوژی پراکنش جغرافیایی، توصیف نحوه انتشار گیاهان و تحلیل و تفسیر آن‌ها است (نقی‌نژاد و همکاران، ۱۳۹۴). فلور هر ناحیه نتیجه واکنش‌های جامعه زیستی در برابر شرایط محیط کنونی و تکامل گیاهان در دوران گذشته است. مطالعات فلورستیک سندی از حضور و وقوع همه تاکسون‌های گیاهی در یک ناحیه معین بوده، که از ارزش زیادی برخوردار است (عبدی و افشار زاده، ۱۳۹۱). فلور هر منطقه یکی از مهم‌ترین پدیده‌ها و سیمای ظاهری یک منطقه است. زیرا گیاهان موجودات پابرجایی هستند که در دراز مدت کلیه شرایط و رخداد‌های محیط-زیست را تحمل کرده و سرانجام به وضع موجود درآمده‌اند و با تنش‌های زیست‌محیطی سازگار شده‌اند (تیمورزاده و همکاران، ۱۳۹۴). شناخت گونه‌های گیاهی و دقت در روند تغییرات آن، امکان برنامه‌ریزی و انتخاب راه‌کارهای مناسب برای مدیریت اکوسیستم منطقه را فراهم می‌آورد. مطالعات فلورستیکی یکی از فرایندهای مهم سیستماتیک گیاهی است که با ارائه ویژگی‌های کمی و کیفی پوشش گیاهی، زوایای ناشناخته پوشش گیاهی مناطق را آشکار ساخته و همانند شناسنامه‌ای برای آن منطقه محسوب می‌شود (احیایی و همکاران، ۱۳۹۳).

هر گونه گیاهی گستره اکولوژیک منحصر به فرد دارد و میزان معینی از تغییرات اکولوژیک را تحمل می‌کند، بنابراین عرصه انتشار هر گونه با توجه به شرایط زیستی و میزان سازش آن‌ها با محیط ممکن است محدود یا وسیع باشد؛ بنابراین تحقیقات فلورستیک یک منطقه برای شناخت دقیق‌تر توان محیط و نیز مدیریت و حفاظت از ذخایر ژنتیکی به منظور برخورداری از شبکه‌های حیاتی پیچیده‌تر و در نتیجه محیط پایدارتر، ضروری است و مبنایی برای نقشه‌های پوشش گیاهی هر منطقه است (خرازیان و همکاران، ۱۳۹۶). فرم رویشی گیاهان در یک اجتماع در پاسخ به عوامل توپوگرافی و متغیرهای محیطی تغییر می‌کند. شکل‌های ویژه سطح زمین باعث ایجاد خرد اقلیم‌های متفاوتی در نواحی وسیع می‌شوند بنابراین می‌توانند در ایجاد پوشش‌های گیاهی مختلف در ارتفاعات، شیب‌ها و جهات دامنه‌های مختلف اثرگذار باشند (آتشگاهی و همکاران، ۱۳۹۴).

احسانی و همکاران (۱۳۹۸)، در مطالعه‌ای با هدف انتخاب سایت‌های حفاظتی جهت برنامه‌ریزی مدیریتی براساس ارزیابی فلورستیکی و تنوع گونه‌ای پرداختند. نتایج نشان داد در مجموع ۷۸ گونه گیاهی از ۲۰ تیره در منطقه پراکنش دارند که خانواده گیاهی Poaceae با ۲۳ درصد بیشترین فراوانی را دارا بود. این مطالعه نشان داد که ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه بر تنوع و غنای گونه‌ای منطقه تأثیر معنی‌دار داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که جهت دامنه تأثیر معنی‌داری بر غنای گونه‌ای داشته است. خرازیان و همکاران (۱۳۹۶) به بررسی ترکیب فلورستیکی، شکل‌های رویشی، تعیین پراکنش جغرافیایی، ارزش حفاظتی، دارویی، سمی و مرتعی گیاهان منطقه حفاظت شده زرچشمه شهر اصفهان پرداختند. شکل‌های زیستی گیاهان در تمام فصل‌های رویشی و در چندین مرحله جمع‌آوری شده و تحلیل پراکنش جغرافیایی با استفاده از روش Raunkiaer و تقسیم‌بندی نواحی فیتو بررسی گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در مجموع تعداد ۱۵۰ گونه متعلق به ۱۱۵ جنس و ۳۳ تیره از گیاهان آوندی در این منطقه وجود دارد. ۷ تیره، ۲۱ جنس و ۲۵ گونه متعلق به تک لپه‌ای‌ها و ۲۶ تیره، ۹۴ جنس و ۱۲۵ گونه متعلق به دولپه‌ای‌ها می‌باشد. طیف‌زیستی منطقه نیز حاکی از آن است که ۵۰ درصد از گونه‌ها همی-کریپتوفیت، ۲۵ درصد تروفیت، ۱۱ درصد ژئوفیت، ۷ درصد کامفیت، ۴ درصد فانروفیت و ۳ درصد هیدروفیت می‌باشند. همچنین از لحاظ پراکندگی جغرافیایی ۷۳ درصد ایرانی-تورانی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که ۲۹ گونه انحصاری، ۷۸ گونه دارویی، ۵۱ گونه مرتعی و ۲۳ گونه سمی در این منطقه شناسایی شده است. از نظر ارزش حفاظتی گونه‌ها نیز، ۱۹ گونه در موقعیت خطر کمتر و یک گونه آسیب پذیر می‌باشد.

تیمورزاده و همکاران (۱۳۹۴) به مطالعه رویشگاه جنگلی در شرق نمین پرداختند. در نتیجه مطالعات، ۱۲۸ گونه شناسایی شده که متعلق به ۴۳ خانواده و ۱۰۸ جنس گیاهی می‌باشند. تیره‌های Rosaceae، Poaceae، Fabaceae، Apiaceae و Asteraceae بیش‌ترین فراوانی را در منطقه و همی کریپتوفیت‌ها با ۴۷ درصد (۶۱ گونه) و فانروفیت‌ها با ۲۲ درصد (۲۸ گونه) فراوان‌ترین اشکال زیستی منطقه را تشکیل می‌دهند.

نقی‌نژاد و همکاران (۱۳۹۴) به مطالعه فلوریستیک در ارتفاعات کوهستان‌های مرزی ارزنه، در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال غربی تایباد، استان خراسان رضوی پرداختند. به‌منظور بررسی فلوریستیکی منطقه، تعداد ۲۵۳ گونه گیاهی از ۵۱ تیره و ۱۸۶ شناسایی شد. همی کریپتوفیت‌ها با ۳۷/۵ درصد، تروفیت‌ها با ۳۲/۸ درصد، اشکال زیستی منطقه را تشکیل می‌دهند. پس از آنها به ترتیب ژئوفیت‌ها با ۱۴/۸ درصد، کامفیت‌ها با ۹/۸ درصد و فانروفیت‌ها با ۴/۷ درصد اشکال زیستی منطقه را تشکیل دادند. از نظر کورولوژی بیش‌ترین سهم مربوط به عناصر ایرانی- تورانی (۵۵/۹) درصد می‌باشد و بقیه متعلق به دو، سه یا چند منطقه جغرافیایی و یا با پراکنش جهانی می‌باشند. هم‌چنین از بین گونه‌های گیاهی شناسایی شده، تعداد ۳۱ گونه، انحصاری سرزمین ایران و محدوده فلورا ایرانیکا بودند بر اساس معیار IUCN دو دسته از گونه‌های آسیب‌پذیر و با خطر کمتر تعیین شد که در مجموع ۷ گونه در دسته گونه‌های تهدید شده در منطقه شناسایی شدند.

احیایی و همکاران (۱۳۹۳) به‌منظور بررسی تنوع و شناسایی و معرفی گونه‌های گیاهی حاشیه دریاچه زریوار مریوان و نیز تعیین اشکال زیستی و کورولوژی آن‌ها مطالعه‌ای انجام دادند که حاصل آن شناسایی ۲۵۷ گونه گیاهی متعلق به ۵۳ خانواده و ۱۸۳ جنس بود. طیف زیستی رستنی‌ها نشان داد که در این ناحیه شکل زیستی تروفیت با ۴۲ درصد غالب است و پس از آن همی کریپتوفیت‌ها با ۳۸/۱ درصد، کریپتوفیت‌ها با ۱۶ درصد، فانروفیت‌ها با ۲/۴ درصد و کامفیت‌ها با ۱/۵ درصد در رده‌های بعدی قرار داشتند. بررسی طیف جغرافیای رستنی‌های محدوده مطالعه‌شده نشان داد بیشترین عناصر (۹۹ گونه) به ناحیه ریشی ایران- تورانی تعلق دارند.

بصیری و همکاران (Basiri et al., 2011) به مطالعه فلور، شکل زیستی و کوروتیپ گیاهان در جنگل کران‌رودی بهبهان پرداختند. در این بررسی، ۸۲ گونه متعلق به ۷۰ جنس و ۲۶ خانواده شناسایی شد که خانواده‌های Compositae (۱۴ گونه)، Caryophyllaceae (۶ گونه)، Gramineae (۱۳ گونه) و

Papilionaceae (۱۸ گونه) از بیش‌ترین فراوانی برخوردار بودند. در این بررسی، گیاهان با شکل زیستی تروفیت و منشأ ناحیه ایرانی- تورانی بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص دادند. باتوجه به مطالعات انجام شده و به علت اهمیت بسیار بالای اطلاع از ترکیب گونه‌ای و شکل زیستی و وضعیت کلی مراتع جهت تدوین برنامه‌های درست جهت حفظ منابع موجود و عدم آسیب رسانی به مرتع و دردسترس نبودن اطلاعات از قبل انجام شده در مراتع مورد بررسی در این پژوهش، شناخت ارکان و جزئیات منطقه مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است.

فتاحی و همکاران (Fattahi et al., 2009) در تحقیقی به بررسی شکل رویشی و جغرافیای گیاهی مناطق جلگه‌ای شمال کشور پرداختند. در این مطالعه، ۱۱۰ گونه، ۹۳ جنس و ۴۰ خانواده و شناسایی شدند که تعداد ۲۱ گونه آن (۱۹٪/۱) انحصاری ایران بودند. مهم‌ترین تیره‌های گیاهی منطقه Gramineae (۲۲ گونه و ۲۰٪)، Compositae (۱۱ گونه و ۱۰٪)، Leguminosae (۹ گونه و ۸٪/۱۸) و Cyperaceae و Labiatae (هرکدام با ۶ گونه و ۵٪/۴۵) بودند.


مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

منطقه لشگردر ملایر با مساحت ۳۴۱۰ کیلومتر مربع در محدوده مختصات ۴۸ و ۴۹ درجه طول جغرافیایی و ۳۴ و ۱۷ دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است این منطقه از نظر تقسیمات کشوری در استان همدان و در شهرستان ملایر قرار دارد (شکل ۱). بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ملایر (۱۹۹۲-۲۰۱۴)، درجه حرارت سالانه منطقه ۱۳/۴۵+ درجه سانتی‌گراد است که در فصول زمستان و تابستان از ۴/۲- تا ۲۸+ درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند. سردترین ماه‌های سال دی (۰/۰۸ درجه سانتی‌گراد) و گرم‌ترین آن تیر (۲۶/۷۴ درجه) است. میانگین بارش منطقه ۳۲۳/۱ میلی‌متر در سال می‌باشد. سنگ‌شناسی منطقه شامل سنگ‌های دگرگونی شیل، اسلیت و شیست‌های دوره ژوراسیک و سنگ‌های آهکی دولومیتی زرد می‌باشد، این منطقه دارای تیپ اراضی کوه‌ها است که از کوهستان‌های بسیار مرتفع با سنگ‌های آهکی و دگرگونی تشکیل شده است (فتاحی و همکاران، ۱۳۹۷). منطقه مورد مطالعه، بخش‌های کوهپایه‌ای دامنه‌های جنوبی مراتع کوه گرمه ملایر است که بخشی از منطقه حفاظت شده لشگردر محسوب می‌شود. مساحت این قسمت از دامنه‌های جنوبی حدود ۲۸۳ هکتار است که مورد چرای دام‌های اهلی قرار می‌گیرد.

روش تحقیق

برای تهیه لیست فلوریستیک طی چند مرحله بازدید و پیمایش صحرایی به صورت تصادفی اقدام به جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی و عکس‌برداری از کلیه نمونه‌های مشاهده شده در عرصه شد. سپس با بهره‌گیری از منابع معتبر علمی گیاه‌شناسی و فلورهای مختلف (ایرانی‌کا، ترکیه، فلور رنگی ایران) (Bassiri et al., 2011)، کلیه گونه‌ها شناسایی شد و لیست فلوریستیک منطقه، نام تیره، دوام عمر، شکل زیستی، فرم رویشی هر گونه در جدول (۱-۴) ارائه شده است.



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد

نتایج

لیست فلوریستیک

در بررسی پوشش گیاهی منطقه لشگردر ملایر در مجموع ۱۶۷ گونه متعلق به ۲۴ تیره و ۱۱۴ جنس شناسایی شد (جدول ۱). بیش‌ترین گونه‌ها متعلق به خانواده Compositae و Leguminosae که گونه‌هایی خوش‌خوراک می‌باشند (شکل ۱). طبقه‌بندی گیاهان براساس شکل رویشی نشان می‌دهد که بیش‌ترین گیاهان منطقه علفی می‌باشند. در ادامه لیست فلوریستیک کامل گیاهان منطقه حفاظت شده لشگردر ارائه می‌گردد (جدول ۱).

جدول ۱- لیست فلوربستییک منطقه، کلاس خوشخوراکی، عناصر رویشی و کارکرد اکوسیستمی گونه‌ها

ردیف	گونه	خانواده	کلاس خوشخوراکی	طول عمر	فرم رویشی	عناصر رویشی	کارکرد	طبقه بندی رانکایر
۱	<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Boraginaceae	III	B/P	علفی	M-IT	Md	He
۲	<i>Heliotropium eichwaldii</i> Steud.	Boraginaceae	II	A	علفی	M-IT	Fg	Tr
۳	<i>Lappula barbata</i> (M.Bieb.) Gürke	Boraginaceae	II	A/B	علفی	M-IT	Fg, Wbd	Tr
۴	<i>Lapula microcarpa</i> (Ledeb.) Gurke in Engler et Parntl	Boraginaceae	II	A/B	علفی	M-IT	Wbd	Tr
۵	<i>Moltkia caerulea</i> (Wild.) Lehm.	Boraginaceae	II	P	علفی	M-IT	Wbd, Cons	He
۶	<i>Nonnea caspica</i> (Willd.) G. Don.	Boraginaceae	III	A	علفی	H	Wbd	Tr
۷	<i>Onosma sericeum</i> Willd.	Boraginaceae	II	P	علفی	M-IT	Wbd, Cons	He
۸	<i>Paracaryum rugulosum</i> (DC.) Boiss.	Boraginaceae	II	P	علفی	M-IT	Wbd, Fg	He
۹	<i>Rochelia cardiosepala</i> Bunge.	Boraginaceae	III	A	علفی	M-IT	Wbd	Tr
۱۰	<i>Trichodesma incanum</i> (Bge.) A. DC. In DC.	Boraginaceae	II	P	علفی	M-IT	Fg. Wint, Wbd	He
۱۱	<i>Asyneuma asperum</i> (Boiss.) , Schiman-Czeika	Campanulaceae	II	P	علفی	M-IT	Fg	He
۱۲	<i>Acanthophyllum microcephalum</i> Boiss.	Caryophyllaceae	III	P	بوته ای	M-IT	Cons, Wbd	Cha
۱۳	<i>Acanthophyllum squarrosus</i> Boiss.	Caryophyllaceae	III	P	بوته ای	M-IT	Cons, Wbd	Cha
۱۴	<i>Anemone biflora</i> DC.	Caryophyllaceae	III	P	علفی	M-IT	Wbd	He
۱۵	<i>Dianthus macranthus</i> Boiss	Caryophyllaceae	III	P	بوته ای	M-IT	Pois, Md	Cha
۱۶	<i>Dianthus orientalis</i> Adams in Weber, Mohr.	Caryophyllaceae	III	P	بوته ای	M-IT	Pois, Md	Cha
۱۷	<i>Gypsophila bellidifolia</i> Boiss.	Caryophyllaceae	I	A	علفی	M-IT	Fg, Wbd	Tr
۱۸	<i>Gypsophila caricifolia</i>	Caryophyllaceae	I	P	علفی	IT-In	Fg, Cons, Wbd	He
۱۹	<i>Minurtia picta</i> (Sibth. , Smith) Bornm.	Caryophyllaceae	II	A	علفی	M-IT	Fg, Wbd	Tr
۲۰	<i>Silen commelinifolia</i> Boiss.	Caryophyllaceae	III	P	علفی	M-IT	Wbd	He
۲۱	<i>Silen conoidea</i> L.	Caryophyllaceae	III	A	علفی	M-IT	Wbd	Tr
۲۲	<i>Silen morganae</i> Freyn.	Caryophyllaceae	III	P	علفی	M-IT	Pois, Md	He
۲۳	<i>Vacaria pyramidata</i> medic.	Caryophyllaceae	III	A	علفی	M-IT	Fg. Wint	Tr
۲۴	<i>Ceratocarpus arenarius</i> L.	Chenopodiaceae	III	A	بوته ای	IT-In	Wbd	Tr
۲۵	<i>Noaea mucronata</i> (Forssk.) Aschers et Schweinf.	Chenopodiaceae	III	P	بوته ای	IT-In	Wbd, Fg	Cha
۲۶	<i>Salsola kali</i> L.	Chenopodiaceae	III	A	بوته ای	SS	Wbd	Tr
۲۷	<i>Achillea vermicularis</i> Trin.	Compositae	III	P	علفی	M-IT	Cons, Wbd, Md	He
۲۸	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	Compositae	III	P	علفی	M-IT	Wbd	He
۲۹	<i>Artemisia fragrans</i> Willd.	Compositae	II	P	بوته ای	M, ES	Wbd, Fg. Wint.	Cha
۳۰	<i>Cardinia orientalis</i>	Compositae	III	A	علفی	M-IT	Wbd	Tr
۳۱	<i>Carthamus oxianantha</i> M. B.	Compositae	Inv, III	A	بوته ای	M-IT	Wbd	Tr
۳۲	<i>Centaurea balsamita</i> Lam.	Compositae	III	A	بوته ای	M-IT	Wbd	Tr
۳۳	<i>Centaurea bruguierana</i> (DC.)Hand	Compositae	Inv, III	A	بوته ای	M-IT	Wbd	Tr
۳۴	<i>Centaurea ovina</i> Pall. ex Wild.	Compositae	III, Inv	B/P	بوته ای	M-IT	Fg	Cha

ادامه جدول (۱)

ردیف	گونه	خانواده	کلاس خوشخواری	طول عمر	فرم رویشی	عناصر رویشی	کارکرد	طبقه- بندی رانکایر	
۳۵	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Compositae	Inv, III	A	بوته ای	Cos	Wbd	Tr	
۳۶	<i>Chondrilla juncea</i> L.	Compositae	I	A	علفی	IT-In	Fg	He	
۳۷	<i>Cichorium intybus</i> L.	Compositae	II	P	علفی	IT-In	Fg, Md	He	
۳۸	<i>Cirsium alatum</i> (S.G. Gmelin) Bobrov	Compositae	Inv, III	P	بوته ای	M-IT	Wbd	Cha	
۳۹	<i>Cnicus benedictus</i> L.	Compositae	II	A	بوته ای	SS	Fg	Tr	
۴۰	<i>Cousinia bachtiarica</i> Bois. , Hausskn.	Compositae	Inv, III	P	بوته ای	IT-In	Wbd	Cha	
۴۱	<i>Cousinia cylindracea</i> Boiss.	Compositae	Inv, III	P	بوته ای	IT-In	Wbd	Cha	
۴۲	<i>Cousinia khorramabadensis</i> Bornm. In Koeie.	Compositae	Inv, III	P	بوته ای	IT-In	Wbd	Cha	
۴۳	<i>Cousinia nujanensis</i> Attar, Ghahreman , Saber	Compositae	III	P	بوته ای	M-IT	Wbd	Cha	
۴۴	<i>Crupina crupinastrum</i> (Moris) Vis.	Compositae	II	A	علفی	M-IT	Fg	Tr	
۴۵	<i>Echinops macrophyllus</i> Boiss, Hausskn. In Boiss.	Compositae	III	P	بوته ای	IT-In	Wbd	Cha	
۴۶	<i>Echinops pungens</i> Trautv.	Compositae	III	P	بوته ای	M-IT	Wbd	Cha	
۴۷	<i>Garhadiolus angulosus</i> Jaub. et Spach	Compositae	I	A	علفی	M, ES	Fg	Tr	
۴۸	<i>Gundelia tourniforti</i> L.	Compositae	Inv, III	P	بوته ای	M-IT	Fd	Cha	
۴۹	<i>Helichrysum oligocephalum</i> DC.	Compositae	III	P	بوته ای	IT-In	Cons, Wbd	Cha	
۵۰	<i>Helichrysum pallasii</i> (Spreng.) Ledeb.	Compositae	III	P	بوته ای	M-IT	Cons, Wbd	Cha	
۵۱	<i>Koelpinia tenuissima</i> Pavl. et Lipsch.	Compositae	III	A	علفی	SS	Wbd, Fg	Tr	
۵۲	<i>Picris strigosa</i> M. B.	Compositae	II	B/P	علفی	M-IT	Fg	He	
۵۳	<i>Scariola orientalis</i> (Boiss) Sojak.	Compositae	II	P	بوته ای	M-IT	Fg, Cons, Wbd	Cha	
۵۴	<i>Scorzonera longipapposa</i> Rech. f.	Compositae	I	P	علفی	M-IT	Fg	He	
۵۵	<i>Scorzonera ramosissima</i> Dc.	Compositae	II	P	علفی	M-IT	Cons, Wbd	He	
۵۶	<i>Senecio vernalis</i> W. K.	Compositae	II	A	علفی	M, ES	Fg	Tr	
۵۷	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mzt.	Compositae	I	A/B	علفی	Cos	Fg	Tr	
۵۸	<i>Taraxacum roseum</i> Bornm. , Hand.-Mzt.f.	Compositae	I	P	علفی	Cos	Fg	He	
۵۹	<i>Tragopogon</i> sp.	Compositae	I	A	علفی	IT-In	Fg, Fd	Tr	
۶۰	<i>Convolvulus</i> sp.	Convolvulaceae		I	P	علفی	Cos	Fg	He
۶۱	<i>Alyssum longistylum</i> (Sommier, Levier) Grossh.	Cruciferae	III	P	علفی	Cos	Md	He	
۶۲	<i>Alyssum marginatum</i> Steud. ex Boiss.	Cruciferae	III	A	علفی	Cos	Md, Wbd	Tr	
۶۳	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medicus	Cruciferae	II	A/B	علفی	IT-In	Fg, Md	Tr	
۶۴	<i>Draba nemorosa</i> L.	Cruciferae	II	A	علفی	Cos	Fg	Tr	
۶۵	<i>Goldbachia laevigata</i> (M.B.) DC.	Cruciferae	II	A	بوته ای	M, ES	Fg	Tr	
۶۶	<i>Malcolmia africana</i> (L.) R. Br.	Cruciferae	III	A	علفی	M-IT	Wbd	Tr	
۶۷	<i>Robeshia schimperii</i> (Boiss.) O. E. Schuiz.	Cruciferae	II	A	علفی	M, ES	Fg	Tr	
۶۸	<i>sisymbrium irio</i> L.	Cruciferae	I	A	علفی	Cos	Fg, Fd , Md	Tr	
۶۹	<i>Sterigmostemum sulphureum</i> Bornm.	Cruciferae	II	B	علفی	M-IT	Fg. , Md	He	

ادامه جدول (۱)

ردیف	گونه	خانواده	کلاس خوشخوراکی	طول عمر	فرم رویشی	عناصر رویشی	کارکرد	طبقه - بندی رانکایر
۷۰	<i>Carex demissa</i> Hornem.	Cyperaceae	III	P	شبه گراس	IT-In	Cons, Wbd , Fg	Cr
۷۱	<i>Carex stenophylla</i> Wahlenb	Cyperaceae	II	P	شبه گراس	IT-In	Fg , Wbd	Cr
۷۲	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae	II	P	شبه گراس	IT-In	Cons, Wbd , Fg	Cr
۷۳	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Cyperaceae	II	P	علفی	IT-In	Cons, Wbd , Fg	He
۷۴	<i>Asperula setosa</i> Jaub. et Spach	Dipsaceae	I	A	علفی	IT-In	Fg	Tr
۷۵	<i>Pterocephalus</i> sp.	Dipsaceae	II	P	علفی	IT-In	Fg, Cons, Wbd	He
۷۶	<i>Scabisa olivieri</i> Coult.	Dipsaceae	II	A	علفی	IT-In	Fg	Tr
۷۷	<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Raf.	Euphorbiaceae	III	A	علفی	IT-In	Fg , Wbd	Tr
۷۸	<i>Euphorbia boissieriana</i> (Woron.) Prokh.	Euphorbiaceae	Inv , III	P	بوته ای	IT-In	Pois	Cha
۷۹	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbiaceae	Inv , III	A	بوته ای	IT-In	Pois	Tr
۸۰	<i>Euphorbia virgata</i> W.K.	Euphorbiaceae	Inv , III	P	بوته ای	IT-In	Pois	Cha
۸۱	<i>Erodium ciconium</i> (Jusl.) L, Her ex Aiton	Geraniaceae	II	A	علفی	IT-In	Fg , Wbd	Tr
۸۲	<i>Aegilops triuncialis</i> L.	Gramineae	III	A	گراس	IT-In	Wbd	Tr
۸۳	<i>Avena fatua</i>	Gramineae	II	P	گراس	IT-In	Fg , Wbd	Cr
۸۴	<i>Boissiera squarrosa</i> (Banks et Soland.) Nevski	Gramineae	III	A	گراس	IT-In	Wbd	Tr
۸۵	<i>Bromus danthoniae</i> Tin.	Gramineae	II	A	گراس	IT-In	Fg	Tr
۸۶	<i>Bromus tectorum</i> L.	Gramineae	II	A	گراس	IT-In	Fg	Tr
۸۷	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Gramineae	I	P	گراس	IT-In	Fg, Cons , Wbd	Cr
۸۸	<i>Henrardia persica</i> (Boiss.) C.E. Hubb.	Gramineae	I	A	گراس	IT-In	Fg	Tr
۸۹	<i>Heteranthelium piliferum</i> (Banks et Soland.) Hochst.	Gramineae	III	A	گراس	IT-In	Wbd	Tr
۹۰	<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Gramineae	I	P	گراس	IT-In	Fg, Cons , Wbd	Tr
۹۱	<i>Hordeum glaucum</i> Steud.	Gramineae	III	A	گراس	IT-In	Wbd	Tr
۹۲	<i>Milium vernale</i> M.B.	Gramineae	I	A	گراس	IT-In	Fg	Tr
۹۳	<i>Poa annua</i> L.	Gramineae	I	A	گراس	IT-In	Fg , Cons	Tr
۹۴	<i>Poa bulbosa</i> L.	Gramineae	I	P	گراس	IT-In	Fg, Cons , Wbd	Cr
۹۵	<i>Poa trivialis</i> L.	Gramineae	I	P	گراس	IT-In	Fg , Cons	Cr
۹۶	<i>Stipa parviflora</i> Dosf.	Gramineae	I	P	گراس	IT-In	Fg, Cons , Wbd	Cr
۹۷	<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.) Nevski.	Gramineae	III	A	گراس	IT-In	Wbd	Tr
۹۸	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmelin.	Gramineae	I	A	گراس	IT-In	Fg	Tr
۹۹	<i>Juncus articulatus</i> L.	Juncaceae	II	P	شبه گراس	IT-In	Cons , Fg	Cr
۱۰۰	<i>Ajuga chamaecistus</i> Ging. et Benth	Labiatae	II	P	بوته ای	IT-In	Cons	Cha
۱۰۱	<i>Lallemantia iberica</i> Fisch. et Mey.	Labiatae	II	A	بوته ای	Cos	Fg	Tr
۱۰۲	<i>Marrubium parviflorum</i> Fisch, C. A. Mey.	Labiatae	II	P	بوته ای	M-IT	Fg , Cons	Cha
۱۰۳	<i>Marubium vulgare</i> L.	Labiatae	III	P	بوته ای	M-IT	Fg	Cha

ادامه جدول (۱)

ردیف	گونه	خانواده	کلاس خوشخوراکی	طول عمر	فرم رویشی	عناصر رویشی	کارکرد	طبقه - بندی رانکایر
۱۰۴	<i>Phlomis bruguieri</i> Desf.	Labiatae	III	P	بوته ای	Cos	Fg , Cons	Cha
۱۰۵	<i>Phlomis olivieri</i> Benth.	Labiatae	III	P	بوته ای	M-IT	Md , Cons	Cha
۱۰۶	<i>Salvia acetabulosa</i> L.	Labiatae	II	P	بوته ای	M-IT	Fg , Cons	Cha
۱۰۷	<i>Salvia virgata</i> Jacq.	Labiatae	III	P	بوته ای	Cos	Fg	Cha
۱۰۸	<i>Stachys inflata</i> Bth.	Labiatae	II	P	علفی	M-IT	Fg, Md , Cons	Cha
۱۰۹	<i>Teucrium polium</i> L.	Labiatae	I	P	علفی	M-IT	Fg , Md	Cha
۱۱۰	<i>Ziziphora tenuior</i> L.	Labiatae	II	A	علفی	Cos	Md , Fg	Tr
۱۱۱	<i>Alhagi camelorum</i> Fisch.	Leguminosae	III, Inv	P	بوته ای	M-IT	Md	Cha
۱۱۲	<i>Astragalus gossypinus</i>	Leguminosae	III	P	بوته ای	M-IT	Cons , Wbd	Cha
۱۱۳	<i>Astragalus parrowianus</i>	Leguminosae	III	P	بوته ای	Cos	Cons , Wbd	Cha
۱۱۴	<i>Astragalus pycnocephalus</i> Fischer	Leguminosae	III	P	بوته ای	M-IT	Cons , Wbd	Cha
۱۱۵	<i>Astragalus susianus</i> Emend	Leguminosae	III	P	بوته ای	M-IT	Cons , Wbd	Cha
۱۱۶	<i>Astragalus straussii</i> Hausskn. ex Born	Leguminosae	III	P	بوته ای	Cos	Cons , Wbd	Cha
۱۱۷	<i>Astragalus argyrostachys</i> Boiss.	Leguminosae	I	P	علفی	M-IT	Fg, Cons , Wbd	He
۱۱۸	<i>Astragalus Askius</i> Bge.	Leguminosae	I	P	علفی	M-IT	Fg, Cons , Wbd	He
۱۱۹	<i>Astragalus campylosema</i> Boiss.	Leguminosae	I	P	علفی	Cos	Fg	He
۱۲۰	<i>Astragalus effuses</i> Bunge.	Leguminosae	I	P	علفی	M-IT	Fg	He
۱۲۱	<i>Astragalus globiflorus</i> Boiss.	Leguminosae	III	P	بوته ای	M-IT	Cons , Wbd	Cha
۱۲۲	<i>Astragalus gossypinus</i> Fischer	Leguminosae	III	P	بوته ای	Cos	Cons, Wbd , Md	Cha
۱۲۳	<i>Astragalus odoratus</i> Lam. علفی	Leguminosae	I	P	علفی	M-IT	Fg, Cons , Wbd	He
۱۲۴	<i>Medicago radiata</i> L.	Leguminosae	I	A	علفی	M-IT	Fg	Tr
۱۲۵	<i>Onobrychis hohenackeriana</i> C.A. Mey	Leguminosae	I	A/B	علفی	Cos	Fg	Tr
۱۲۶	<i>Onobrychis heliocarpa</i> Boiss.	Leguminosae	I	A/B	علفی	M-IT	Fg	Tr
۱۲۷	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Leguminosae	I	P	علفی	M-IT	Fg, Cons , Wbd	He
۱۲۸	<i>Trifolium purpureum</i> Loisel.	Leguminosae	I	A	علفی	Cos	Fg	Tr
۱۲۹	<i>Trifolium repens</i> L.	Leguminosae	I	P	علفی	M-IT	Fg , Cons	He
۱۳۰	<i>Trigonella aurantiaca</i> boiss.	Leguminosae	I	A	علفی	M-IT	Fg, Pion. Sp.	Tr
۱۳۱	<i>Trigonella monantha</i> C.A. Mey.	Leguminosae	I	A	علفی	M, ES	Fg, Pion. Sp.	Tr
۱۳۲	<i>Trigonella spruneriana</i> Boiss.	Leguminosae	I	A	علفی	M, ES	Fg	Tr
۱۳۳	<i>Gagea ova</i> Stapf.	Liliaceae	II	P	علفی	M, ES	Wbd , Cons	He
۱۳۴	<i>Gagea stipitata</i> Marckl. ex Bunge.	Liliaceae	II	P	علفی	M, ES	Wbd , Cons	He
۱۳۵	<i>Muscari comosum</i> Mill.	Liliaceae	III	P	علفی	M, ES	Md, Fg ,Wbd	He
۱۳۶	<i>Muscari longipes</i> Boiss.	Liliaceae	III	P	علفی	M, ES	Md, Fg ,Wbd	He
۱۳۷	<i>Tulipa Montana</i> Lindl.	Liliaceae	III	P	علفی	M, ES	Wbd	He

ادامه جدول (۱)


ردیف	گونه	خانواده	کلاس خوشخوراکی	طول عمر	فرم رویشی	عناصر رویشی	کارکرد	طبقه - بندی رانکایر
۱۳۸	<i>Linum catharticum</i> L.	Linaceae	II	A	بوته ای	M, ES	Wbd	Tr
۱۳۹	<i>Alcea hyrcana</i> (Grossh.) Grossh.	Malvaceae	III	P	بوته ای	M, ES	Md	Cha
۱۴۰	<i>Alcea Koelzii</i> I. Reidl.	Malvaceae	III	P	بوته ای	M, ES	Md	Cha
۱۴۱	<i>Alcea kurdica</i> (Schecht.) Alef.	Malvaceae	III	P	بوته ای	M, ES	Md	Cha
۱۴۲	<i>Malva neglecta</i>	Malvaceae	II	A	علفی	M, ES	Md , Fg	Tr
۱۴۳	<i>Plantago exigua</i> Murray	Plantaginaceae	I	A	علفی	M, ES	Fg	Tr
۱۴۴	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	II	P	علفی	M, ES	Md , Fg	He
۱۴۵	<i>Plantago major</i>	Plantaginaceae	II	P	علفی	M, ES	Md , Fg	He
۱۴۶	<i>Polygonum lusuloides</i> Jaub. , Spach	Polygonaceae	II	P	علفی	M, ES	Fg	He
۱۴۷	<i>Rununculus muricatus</i> L.	Ranunculaceae	II	A	علفی	M, ES	Fg , Wbd	Tr
۱۴۸	<i>Rununculus scleratus</i> L.	Ranunculaceae	II	A	علفی	M, ES	Fg , Wbd	Tr
۱۴۹	<i>Adonis aestivalis</i> L.	Ranunculaceae	II	A	علفی	M, ES	Fg	Tr
۱۵۰	<i>Delphinium cyphoplectrum</i> Boiss.	Ranunculaceae	II	P	علفی	M, ES	Fg	He
۱۵۱	<i>Nigella integrifolia</i> Regal	Ranunculaceae	II	A	علفی	M, ES	Fg	Tr
۱۵۲	<i>Ceratocephalus falcatus</i> (L.) Pers.	Ranunculaceae	I	P	علفی	M, ES	Fg , Wbd	He
۱۵۳	<i>Rununculus pichleri</i> Freyn.	Ranunculaceae	II	P	علفی	M, ES	Fg , Wbd	He
۱۵۴	<i>Hulthemia persica</i> (Michx.) Bomm.	Rosaceae	III	P	بوته ای	M, ES	Wbd	Cha
۱۵۵	<i>Callipeltis cucularia</i> Stev	Rubiaceae	I	A	علفی	M, ES	Fg	Tr
۱۵۶	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Scrophulareaceae	II	A	علفی	M, ES	Fg	Tr
۱۵۷	<i>Scrophularia subaphylla</i> Boiss.	Scrophulareaceae	II	P	بوته ای	M, ES	Fg , Wbd , Cons	Cha
۱۵۸	<i>Verbascum speciosum</i> Schrader.	Scrophulareaceae	Inv , III	B	بوته ای	M, ES	Wbd , Cons	He
۱۵۹	<i>Hyoscyamus reticulatus</i> L.	Solanaceae	III	A/B	بوته ای	M, ES	Md	Cha
۱۶۰	<i>Bunium cylindricum</i> (Boiss. et Hoh.) Drude	Umbelliferae	II	P	علفی	M, ES	Md	He
۱۶۱	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Umbelliferae	III	A	علفی	M, ES	Wbd	Tr
۱۶۲	<i>Echinophora platyloba</i> DC.	Umbelliferae	III	P	بوته ای	M, ES	Md , Fd	Cha
۱۶۳	<i>Eryngium billardieri</i> Delaroche	Umbelliferae	Inv , III	P	بوته ای	H	Md , Fd	Cha
۱۶۴	<i>Eryngium caeruleum</i> M. B.	Umbelliferae	Inv , III	P	بوته ای	IT-In	Md , Fd	Cha
۱۶۵	<i>Eryngium thyrsoideum</i> Boiss.	Umbelliferae	Inv , III	P	بوته ای	M-IT	Md , Fd	Cha
۱۶۶	<i>Scandix iberica</i> L.	Umbelliferae	II	A	علفی	IT-In	Fg.	Tr
۱۶۷	<i>Trigonosciadium brachytaenium</i> (Boiss.)	Umbelliferae	II	P	علفی	IT-In	Fg. Wint	He

علائم اختصاری: Tr: تروفیت، Cha: کامفیت، He: همی کریپتوفیت، Cr: کریپتوفیت، Md: داروئی، Fg: علوفه‌ای، Wbd: حیات وحش و تنوع زیستی، Wint: تغذیه زمستانی دام، Cons: حفاظتی، Pios: سمی، Fd: غذایی، A: یکساله، B: دوساله، P: چندساله، Pion:

گونه پیش قراول، Inv: مهاجم، ایران-تورانی (IT)، ایران تورانی-صحارا سندی (IT-SS)، صحارا سندی (SS)، جهان وطنی (Cos)، هیرکانی (H)، مدیترانه ای (M)، اروپا سبیری (ES)، انحصاری ایران (In).

تعداد تیره، جنس و گونه‌ها


فراوانی گونه و جنس‌های مختلف تیره‌های موجود در منطقه نشان داد تیره‌های Compositae، Leguminosae و Gramineae به ترتیب با ۳۳، ۲۲ و ۱۸ گونه، بیشترین تعداد جنس و گونه را در منطقه دارا هستند و تیره‌های Campanulaceae، Solanaceae، Rosaceae، Polygonaceae، Linaceae و Juncaceae هر کدام با یک گونه، کمترین تعداد جنس و گونه را دارند (شکل ۲).



شکل ۲- فراوانی گونه‌های گیاهی منطقه مورد مطالعه

فراوانی فرم زیستی براساس طبقه‌بندی رانکایر


نتایج طبقه‌بندی گیاهان از نظر شکل زیستی به روش رانکایر در منطقه نشان داد که تروفیت‌ها دارای ۶۹ گونه، کامفیت‌ها ۴۷ گونه، کریپتوفیت‌ها ۹ گونه و همی کریپتوفیت‌ها ۴۲ گونه می‌باشند؛ تروفیت‌ها دارای فراوانی بیشتری نسبت به سایر فرم‌های زیستی هستند (شکل ۳).



شکل ۳- فراوانی اشکال زیستی گونه‌های گیاهی براساس طبقه بندی رانکایر

فراوانی عناصر رویشی

نتایج بررسی‌ها نشان‌دهنده این بود که بیشترین فراوانی گونه‌ها به ترتیب مربوط به نواحی مدیترانه‌ای-ایران تورانی (۳۷٪)، ایران تورانی-بومی (۲۸٪) و مدیترانه ای و اروپا-سیبری (۲۲٪) است در حالیکه کمترین فراوانی به ترتیب مربوط به عناصر رویشی صحارا سندی (۲٪) و هیرکانی (۱٪) است (شکل ۴).



شکل ۴- فراوانی اشکال زیستی گونه‌های گیاهی براساس طبقه بندی رانکایر

فرم رویشی

نتایج نشان می دهد که فرم رویشی غالب گیاهان منطقه مورد مطالعه علفی بوده و ۵۱٪ گونه ها را به خود اختصاص داده و بوته‌ای‌ها با ۳۶٪ گونه‌ها، در جایگاه دوم را به خود اختصاص دادند. گراس‌ها نیز با ۱۱٪ جایگاه سوم را از لحاظ فراوانی داشتند و در این بین شبه‌گراس‌ها کمترین فراوانی را در منطقه دارا بودند (شکل ۵).

طبقه‌بندی گونه‌های گیاهی بر اساس خوش‌خوراکی و مرغوبیت


باتوجه به نتایج به دست‌آمده سهم بیشتر گیاهان حاضر در منطقه به گیاهان کلاس III اختصاص داشت که ۴۱٪ گونه‌ها را شامل می‌شوند و گونه‌های کلاس II و I به ترتیب ۳۴٪ و ۲۲٪ گونه‌ها شامل می‌شوند. فراوانی گونه‌های کلاس III در ترکیب گیاهی منطقه، حاکی از وجود شرایط نامطلوب و شروع سیر قهقهرایی در پوشش گیاهی منطقه است (شکل ۵).

طول عمر

با توجه به جدول (۱) و شکل (۵)، چندساله‌ها بیشترین (۵۹٪)، یکساله‌ها در جایگاه دوم (۳۵٪) و دوساله‌ها کمترین فراوانی (۶٪) را در منطقه داشتند.

کارکرد اکوسیستمی گونه‌ها

بیشتر گیاهان منطقه کارکرد علوفه‌ای داشتند و گیاهان با عملکرد حیات وحش و تنوع زیستی در جایگاه دوم بودند. سپس کارکرد حفاظت خاک و بعد از آن حدود ۱۱٪ از گیاهان شناسایی شده کارکرد دارویی داشتند. کم‌ترین کارکرد گیاهان منطقه مربوط به عملکرد علوفه زمستانی و گیاهان پیش‌گام بود. در انتها گیاهان سمی سهم بسیار اندکی (کمتر از ۱٪) را دارا بودند (شکل ۵).



شکل ۵- درصد حضور گونه‌ها بر اساس فرم رویشی، خوش‌خوراکی، طول عمر، کارکرد و عناصر

بحث و نتیجه‌گیری

رویشگاه‌های گیاهی موجود در یک منطقه نتیجه عملکرد کنش‌های متقابل بین عوامل مختلف اکولوژیکی است. شناسایی و معرفی رستنی‌های یک منطقه برای دسترسی آسان و سریع به گونه گیاهی خاص در محل و زمان معین، تعیین پتانسیل و قابلیت‌های رویشی منطقه، شناسایی گونه‌های مقاوم و گونه‌های در حال انقراض و کمک به حفظ آن‌ها و کمک به تعیین پوشش گیاهی منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد (کاظمیان و همکاران، ۱۳۸۳). حضور ۱۶۷ گونه گیاهی در عرصه‌ای با وسعت ۲۸۳ هکتار، نشان

دهنده تنوع بالای گونه‌های گیاهی در این ناحیه است که بطور معنی داری نسبت به تعداد گونه‌های شناسایی شده در تحقیق احسانی و همکاران (۱۳۹۸)، خرازیان و همکاران (۱۳۹۶)، تیمورزاده و همکاران (۱۳۹۴)، بصیری و همکاران (Basiri et al., 2011) و فتاحی و همکاران (Fattahi et al., 2009)، بیشتر است در حالیکه به لحاظ وسعت منطقه از اغلب آنها کمتر است. علت این تنوع بالا را می‌توان به ارتباط بین عوامل توپوگرافی و شرایط محیطی نسبت داد.

نتایج بررسی طیف زیستی گیاهان موجود در منطقه بیان‌گر این موضوع است که تروفیت‌ها و همی کریپتوفیت‌ها برتری بیشتری نسبت به سایر اشکال زیستی دارند. از نظر پراکنش گونه‌های زیستی بیش‌ترین مقدار مربوط به تیره‌های Compositae, Leguminosae و Gramineae می‌باشد؛ همچنین از نظر طیف بیولوژیک و بر اساس لیست فلوریستیک منطقه (جدول ۱) و بر اساس طبقه بندی رانکایر (شکل ۳)، ترتیب حضور گونه‌ها از لحاظ شکل زیستی به شرح زیر مشاهده شد:

Tr>Cha>He>Cr

به نظر می‌رسد فراوانی تروفیت‌ها حاکی از تخریب‌هایی است که در منطقه صورت گرفته است (شکل ۳)؛ زیرا در نتیجه دخالت‌های انسانی و چرای مفرط دام فرصت توسعه گیاهان یک‌ساله در منطقه افزایش است. از طرف دیگر مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که گونه‌های بوته‌ای، در منطقه مورد مطالعه غالبیت دارند، این درحالی است که گونه‌های بوته‌ای منطقه در تقسیم‌بندی اشکال زیستی رانکایر اغلب متعلق به کاموفیت‌ها و تا حدودی کریپتوفیت‌ها هستند. این یافته، ترتیب حضور اشکال زیستی رانکایر را که در بالا اشاره شد تایید می‌کند. از طرف دیگر با توجه به نتایج مربوط به عناصر رویشی، که در آن گونه‌های منطقه اغلب مربوط به ناحیه مدیترانه‌ای-ایران تورانی بودند با یافته فوق، یعنی فراوانی تروفیت‌ها (یک‌ساله‌ها) و غالبیت بوته‌ایها (کاموفیت‌ها) که شاخص این فلور هستند مطابقت دارد. از بررسی کارکرد گیاهان در مرتع مشخص شد که سهم بیشتر گیاهان به ترتیب به علوفه‌ای‌ها، حیات وحش و تنوع زیستی، حفاظت خاک، اختصاص یافته است، همچنین در تقسیم‌بندی دیگری نیز مشخص شد که بیشتر گونه‌های حاضر به علفی‌ها و بوته‌ای‌ها اختصاص دارند (شکل ۵). بنابراین کورولوژی و فرم رویشی گونه‌ها نشان می‌دهد که منطقه مورد مطالعه با اطمینان کامل بخشی از ناحیه اقلیمی مدیترانه‌ای و زیر ناحیه اقلیمی (رویشی) ایران تورانی است که با نتایج احیایی و همکاران (۱۳۹۳)، بصیری و همکاران (Basiri et al., 2011)، مطابقت دارد و دلیل این تطابق، تشابه عرضهای جغرافیایی و اقلیم مناطقی است که در آن این تحقیقات انجام شده است. در حالیکه با نتایج نقی‌نژاد و همکاران (۱۳۹۴)، فتاحی و همکاران (Fattahi et al., 2009)، تیمورزاده و همکاران (۱۳۹۴)، مغایرت دارد، زیرا شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی آنها شباهتی به یکدیگر ندارد.

با توجه به اینکه حدود ۳۰٪ گونه‌های منطقه بومی و انحصاری ایران هستند به نظر می‌رسد که پوشش گیاهی منطقه از اهمیت بالایی به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی و تنوع گونه‌ای گیاهی کشوری برخوردار است. هرچند که در حال حاضر مراتع منطقه مدیریت مناسبی ندارند؛ اما در مجموع، تعلق حدود ۶۵٪ عناصر رویشی منطقه به اقلیم زیستی ایران-تورانی نشان‌دهنده مساعد بودن عوامل اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه و توانمندی بالای پتانسیل‌های زیستی آن برای حمایت و استقرار بخش عمده‌ای از گونه‌های این فلور است. همچنین فراوانی ۱۰٪ گونه‌های جهان وطنی نیز تأیید دیگری بر واقعیت فوق و نیز انتخاب درست منطقه برای انجام این پژوهش است. در بین گونه‌های شناسایی شده حدود ۲۲٪ از گونه‌های موجود در عرصه دارای خوش‌خوراکی کلاس I، ۳۴٪ کلاس II، ۴۱٪ کلاس III و ۳٪ از گونه‌های موجود مهاجم بودند (شکل ۵). این درصد‌های فراوانی نشان‌دهنده کاهش گونه‌های خوش‌خوراک و بالا بودن گونه‌های زیاده‌شونده و غیرقابل استفاده و مهاجم در عرصه است و وضعیت چندان مطلوبی از لحاظ ترکیب گونه گیاهی در منطقه را نشان نمی‌دهد. در بررسی‌ها مشخص شد که غالب گیاهان منطقه از چندساله‌ها و ترکیبی از بوته‌ای و علفی‌ها هستند. فراوانی گیاهان چندساله در یک ناحیه می‌تواند گواهی بر یکی از موارد زیر باشد: - اگر بیشتر ترکیب گونه‌ای از نوع علفی باشند؛ یعنی شرایط حاکم بر منطقه مناسب و حفاظتی است. - اگر بیشتر گیاهان دارای فرم رویشی بوته‌ای باشند؛ یعنی بهره‌برداری شدید در منطقه صورت گرفته است. - اگر گونه‌های گیاهی ترکیبی از فرم‌های رویشی بوته‌ای و علفی باشند؛ یعنی منطقه در اواسط مرحله حفاظت یا مرحله بهره‌برداری است یا دارای برنامه مناسبی جهت بهره‌برداری است. براساس نتایج شکل (۵) و جدول (۱)، شرایط منطقه در اواسط دوره حفاظت است؛ زیرا علفی‌ها در منطقه در حال افزایش‌اند. یافته‌های این پژوهش با مطالعات احیائی و همکاران (۱۳۹۳) و بصیری و همکاران (Basiri et al., 2011) مطابقت دارد. علت این تطابق را می‌توان به وجود شرایط آب و هوایی مشابه و در وهله دوم به اثرات ناشی از بهره‌برداری‌ها و چرای مفرط و دخالت‌های انسانی که نقطه مشترک بین این مطالعات است نسبت داد.

سپاسگزاری

این مقاله از درس سمینار دانشجویان مقطع ارشد مرتعداری دانشگاه ملایر با راهنمایی دکتر بختیار فتاحی استخراج شده است. بدین وسیله از کلیه افرادی که در بخش‌های مختلف این تحقیق تلاش و همکاری کردند تقدیر و تشکر می‌گردد.

منابع

- آتش‌گاهی، ز.، اجتهادی، ح.، زارع، ح. ۱۳۹۴. ارتباط عوامل توپوگرافی و تنوع گیاهان در جنگل‌های شرق دودانگه ساری استان مازندران، مجله زیست‌شناسی ایران، شماره ۲۸ (۱): ۱-۱۱.
- احسانی، س.م.، تمرناش، ر.، حشمتی، غ.، شیدای کرکچ، ا. ۱۳۹۸. انتخاب سایت‌های محافظت شده برای برنامه ریزی مدیریت بر اساس ارزیابی تنوع فلوربستیکی و گونه (مطالعه موردی: ولویه کیاسر، مازندران). مجله تحقیقات گیاهان (مجله زیست‌شناسی ایران)، ۳۳: ۴۶۵-۴۷۶.
- احیایی، ع.ا.، خراسانی، ن.ا.، ریاضی، ب. ۱۳۹۳. بررسی تنوع گونه‌های حاشیه دریاچه زریوار مریوان، نشریه محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، ۶۷ (۱): ۵۳-۶۴.
- اسماعیل‌زاده، ا.، نورمحمدی، ک.، اسدی، ح.، یوسف‌زاده، ح. ۱۳۹۳. مطالعه فلوربستیکی جنگل‌های صلاح‌الدین کلا، نوشهر، ایران، تاکسونومی و بیوسیستماتیک، ۶ (۱۹): ۳۷-۵۴.
- اسعدی، ع.م.، دادخواه، ع.ر. ۱۳۸۹. بررسی ترکیب فلوربستیکی و غنای گونه‌ای مراتع ییلاقی اسدلی - پلمیس در استان خراسان شمالی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران. جلد ۱۷، شماره ۴، صفحات: ۶۰۳-۵۸۹.
- تیمورزاده، ع.، قربانی، ا.، کاویان‌پور، ا.ح. ۱۳۹۴. بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان جنگل - های جنوب شرقی شهرستان نمین (اسیقران، فندوقلو، حسنی و بوبینی) در استان اردبیل. مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست‌شناسی ایران). جلد ۲۸، شماره ۲.
- خرازیان، ن.، عبائیان، ف.، یوسفی، م. ۱۳۹۶. مطالعه فلوربستیکی منطقه حفاظت‌شده زرچشمه در استان اصفهان. مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست‌شناسی ایران). جلد ۳۰، شماره ۱.
- زارع چاهوکی، م.ع. ۱۳۹۴. کتابچه جامعه شناسی گیاهی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
- عبدی، م.، افشارزاده، س. ۱۳۹۱. بررسی فلوربستیکی منطقه شمال بادرود استان اصفهان، زیست‌شناسی گیاهی، ۴ (۱۳): ۱-۱۲.
- فتاحی، ب.، آقابیکی‌امین، س.، ملکی، م. ۱۳۹۷. مطالعه خصوصیات کشت دو گونه *Acantholimon oliganthum* Boiss و *Acantholimon olivieri* (Jaub. ET Spach) در رشته کوه زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده لشکر در)، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر، پروژه تحقیقاتی.
- قمی، س.، زارع‌چاهوکی، م.ع.، آذرینوند، ح. ۱۳۹۱. بررسی تنوع گیاهان با توجه به شکل‌زیستی و فرم-رویشی در بخشی از مراتع طالقان (مطالعه موردی: مراتع آرتون-فشندک). شماره ۹۶.

کاظمیان، آ.، ثقفی خادم، ف.، قربانی، م.، ۱۳۸۳. مطالعه فلورستیک بند گلستان و تعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه. پژوهش و سازندگی شماره ۶۴، صفحات ۴۸-۶۱.

نقی‌نژاد، ع.ر.، مختاری، س.، جوهرچی، م.ر. ۱۳۹۴. بررسی فلورستیک، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه‌های مرزی ارزنه تایباد، خراسان رضوی. مجله پژوهش‌های گیاهی (مجله زیست-شناسی ایران). جلد ۲۸، شماره ۱.

Archibold, O.W., 1995. Ecology of world vegetation. Chapman and Hall Inc. London, 509p.

Basiri, R., Taleshi, H., Gharehghani, R. 2011. Flora, Life Form and Chorotypes of Plants in River Forest Behbahan, Iran. Middle-East Journal of Scientific Research. 9 (2): 246-252.

Fattahi, B., Aghabeigi Amin, S., Ildoromi, A., Sabetpour, T., Erfanzadeh, R., Ahmadipour, S.H., 2009. Investigation of life form and geographical botany in plain of the north Iran (Case study: Nour, Mazandaran). Journal of Geography and Planing, 14 (27): 1-15.

Naqinezhad, A., Zare Maivan, H., Gholizadeh, H. 2015. A floristic survey of the Hyrcanian forests in Northern Iran, using two lowland-mountain transects, Journal of forest research. 26 (1): 187-199.