



دانشگاه گنبدکاووس

نشریه "حافظت زیست بوم گیاهان"

دوره ششم، شماره سیزدهم

<http://pec.gonbad.ac.ir>

بررسی کاربرد اکوکاور در کنترل گیاهان ناخواسته و اثرات آن بر رشد و نمو نهال‌های وتیور گراس و خصوصیات خاک

حمید نیک نهاد قرمآخر^۱، معصومه احمدی بنی^۲

استادیار گروه مرتع داری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اکوکاور، مالچی اکولوژیک است و کاربرد آن بهمنظور بهبود محیط خاک و ممانعت از گیاهان ناخواسته، روشی ارزان و سازگار با محیط‌زیست می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات اکوکاور بر گیاهان ناخواسته، رشد و نمو نهال‌های و تیور گراس (*Chrysopogon zizanioides*) و خصوصیات خاک است. بهایمنظور، دوسری پلات مستطیلی‌شکل (دارای اکوکاور و فاقد آن) در سه تکرار مستقر گردید. در هر پلات، شش نهال و تیور گراس نشا شده، در انتهای فصل رویش، تعداد گیاهان ناخواسته در هر پلات شمارش و توزین شدند. اثرات اکوکاور بر رشد و نمو نهال‌های و تیور گراس از طریق اندازه‌گیری میانگین طول ریشه‌ها، ارتفاع و محیط تاج پوشش آن‌ها بررسی گردید. خصوصیات خاک با استفاده از دو سری پلات مستطیلی شکل (دارای اکوکاور و فاقد آن) که در سه تکرار و به مدت شش ماه مستقر شدند، بررسی گردید. دو نمونه خاک از هر پلات اخذ شد و در آزمایشگاه برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک تعیین گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS ۱۸ و آزمون تی انجام شد. نتایج نشانگر آن است که میانگین وزن، محیط تاج پوشش و درصد زنده‌مانی پایه‌های گیاهی و تیور گراس درنتیجه کاربرد اکوکاور بهطور معنی‌داری ($p < 0.05$) افزایش یافته است. مضاف بر آن، کاهش معنی‌داری ($p < 0.05$) در تعداد پایه‌های گیاهی سبز شده گیاهان ناخواسته مشاهده گردید. کاهش معنی‌داری ($p < 0.05$) در میانگین درصد رطوبت اشباع و درصد ازت کل و نیز، افزایش معنی‌داری ($p < 0.05$) در میانگین فسفر قابل جذب و منیزیم قابل تبادل خاک ثبت گردید.

واژه‌های کلیدی: احیا مرتع، مالچ اکولوژیک، و تیور گراس (*Chrysopogon zizanioides*)

* نویسنده مسئول: niknahad@gau.ac.ir

مقدمه

اغلب فعالیتهای اصلاحی در مراتع ایران با کشت گیاهان مرتتعی در چاله‌های کوچک (کپه‌کاری) یا ایجاد شیار بر خطوط تراز (کنتور فارو) صورت می‌گیرد (جنگجو، ۱۳۸۸). اجرای عملیات کپه‌کاری ممکن است باعث ایجاد آشفتگی موضعی در سطح مرتتع گردیده (El-Sheikh, ۲۰۰۵; Gao et al., ۲۰۰۹)، سبب افزایش گیاهان مهاجم مرتتع شده و زمینه را برای استقرار گونه‌های ناخواسته از سایر مناطق مساعد نماید (Canals & Sebastia, ۲۰۰۰; Hobbs & Huenneke, ۱۹۹۲). گیاهان ناخواسته موجب افزایش رقابت در استفاده از منابع و نهاده‌ها، مصرف مواد غذایی خاک، انتقال بیماری‌ها، میزبانی آفات، کاهش رشد و عملکرد گیاهان می‌شوند (دادار و نیستانی، ۱۳۸۴). با از بین بردن گیاهان ناخواسته اطراف نهال‌های جوان در زمان استقرار آن‌ها، می‌توان رشد نهال‌ها را افزایش داد (Smith et al., ۲۰۰۰). حذف این گیاهان از طریق دستی و استخدام کارگر، هزینه هنگفتی می‌طلبد و ضمن افزایش خطر فرسایش خاک، در بلندمدت اثر منفی روی ساختمان خاک و عملکرد آن دارد (Schupp & McCue, ۱۹۹۶). کاربرد علف‌کش‌های شیمیایی نیز دارای پیامدهای محیط‌زیستی است (Abdin et al., ۲۰۰۰; Buhler, ۱۹۹۶). لذا، استفاده از مالج از تمهدات مهم در کنترل گیاهان ناخواسته می‌باشد (Swanton and Weise, ۱۹۹۱).

بسیاری از خواص و شرایط خاک از جمله ساختمان، رطوبت، نفوذپذیری، میزان تبخیر، میزان علف‌های هرز، درجه حرارت، میزان هدایت و نگهداری گرما، مواد غذایی، نیتریفیکاسیون، حلالیت مواد معدنی، جمعیت میکروارگانیسم‌ها، فرسایش‌پذیری و شوری خاک از طریق شست‌وشو و کنترل تبخیر تحت تأثیر مالج‌ها قرار می‌گیرند (کوچکی، ۱۳۸۲). بهبود محیط فیزیکی خاک در اثر کاربرد مالج، می‌تواند به بهبود تولید گیاهی منجر گردد (Chakraborty et.al., ۲۰۰۸). پوشاندن خاک با مالج، ممکن است ماده آلی به خاک بیافزاید، رشد گیاهان هرز را کاهش دهد و باعث کاهش یا توقف فرسایش گردد (Bot & Benites, ۲۰۰۵). مالج آلی سبب افزایش جمعیت میکروبی خاک نیز می‌گردد (Gan et al., ۲۰۰۳).

مطالعات انجام‌شده بیانگر آن است که مالج، جوانه‌زنی بذر و بقا نهال، ایجاد ریشه و عملکرد کلی گیاه را بهبود بخشیده (Chalker & Scott, ۲۰۰۷)، گسترش و استقرار ریشه‌های گیاهان را در مقایسه با خاک لخت تسهیل نموده (Burgess, ۱۹۹۷) و اثر مثبتی در کاهش بانک بذر گیاهان ناخواسته دارد (غدیری، ۱۳۸۱). استفاده از مالج از طریق کاهش نفوذ نور و تبخیر آب از خاک، سبب کاهش تعداد پایه‌های گیاهان ناخواسته در واحد سطح می‌شود (کاشی و همکاران، ۱۳۷۷؛ Ghosh et al., ۲۰۰۶). مقاومت گیاهان حساس به سرما را در برابر سرما و یخ‌بندان افزایش می‌دهد (مرادی‌نژاد، ۱۳۷۹). توسعه و تراکم ریشه نهال‌ها تحت مالج آلی در مقایسه

با خاک لخت (Watson, ۱۹۸۸) و مالج پلاستیکی (Fausett and Rom, ۲۰۰۱) و یا مالج زنده (Ramakrishna et al., ۲۰۰۶) بیشتر است. راماکریشنا و همکاران (Green & Watson, ۱۹۸۹) در بررسی اثر مالج کاه برنج روی خصوصیات خاک و جمعیت گیاهان ناخواسته دریافتند که دمای خاک طی پاییز و زمستان در کرت‌های پوشیده شده با کاه، بالاتر از زمین بدون پوشش است و مالج کاه، دمای خاک را ۳-۳/۵ درجه سانتی‌گراد افزایش داده است. نتایج کاربرد مالج کاغذی در عرصه‌های تحت کشت Ananas comosus در جزایر هاوایی بهمنظور کنترل گیاهان ناخواسته و حفاظت از رطوبت خاک نشانگر آن است که کاربرد آن از طریق ممانعت از رشد گیاهان ناخواسته، جذب حرارت خاک و کاهش Haapala et al., ۲۰۱۴ تبخیر آب از خاک باعث کاهش چشمگیر هزینه تولید Ananas comosus می‌گردد (). استفاده از شاخه‌های کوچک هرس شده درختان توت، کاه برنج، خاکبرگ، برگ‌های خزان شده و کاه و کلش گندم و یا جو به عنوان مالج در بین ردیف‌های درختان توت، علاوه بر کاهش تراکم گیاهان ناخواسته، در حفظ رطوبت و ساختمان خاک و پیشگیری از صدمات سرمای زمستانه به درختان می‌تواند بسیار مفید باشد (Uchino et al., ۲۰۱۲). آنان همچنین گزارش کردند که استفاده از مالج چاودار تا اواسط تابستان، می‌تواند باعث کاهش بیوماس گیاهان ناخواسته تا ۸۵ درصد شود. گزارش شده است که با استفاده از مالج چاودار می‌توان گیاهان ناخواسته‌ای چون گاو پنبه (Abutilon)، تاج‌خرروس (Chenopodium album)، تاج‌خرروس (teophrasti)، آمارانتس (amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Singogo et al., ۱۹۹۶) را درصد کنترل نمود ().

اکوکاور، نوعی مالج اکولوژیک کاغذی است و با توجه به بررسی‌های انجام‌شده تاکنون هیچ مطالعه‌ای در خصوص اثرات آن بر کنترل گیاهان ناخواسته مراتع دردست احیا و خصوصیات خاک آن مراتع در کشور ایران صورت نگرفته است. در عملیات اصلاح و احیا مراتع از طریق بوته‌کاری، مبارزه با گیاهان ناخواسته بهخصوص در نخستین سال پس از کاشت، اهمیت بسزایی دارد و غفلت از آن می‌تواند باعث شکست برنامه بوته‌کاری شود، لذا تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثرات اکوکاور بر تعداد و بیوماس گیاهان ناخواسته، رشد و نمو نهال‌های و تیورگراس و نیز، خصوصیات خاک انجام گردید.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستای گدمآباد در غرب شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان و در مختصات و "۵۳' و ۷' و ۵۵° طول شرقی و "۷۷' و ۱۶' و ۳۷° عرض شمالی واقع شده است. اقلیم منطقه به روش طبقه‌بندی آمبرژه، نیمه‌خشک گرم تا معتدل است. قسمت بیشتر نزولات آسمانی در فصل سرد واقع شده و فصل تابستان آن، گرم و خشک است. متوسط مقدار بارندگی سالیانه، ۴۶۱

میلی‌متر و جمع تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه شده به روش پنمن-مانتیس، ۱۲۷۰ میلی‌متر در سال است. میانگین درجه حرارت گرم‌ترین ماه سال (مرداد) ۲۹/۳، سردترین ماه سال (بهمن) ۸/۱ و میانگین درجه حرارت سالانه ۱۸/۲ درجه سانتی‌گراد می‌باشد (مجتبهدی و نیکنها د قرماخر، ۱۳۹۲).



شکل ۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه

گیاه و تیورگراس

وتیورگراس (*Chrysopogon zizanioides*) از جنس *Chrysopogon* و از خانواده Poaceae است. گیاهی است پرشاخ و برگ که ریشه‌هایی عمیق دارد و بومی هندوستان است. تیورگراس در خاک‌های فقیر دارای خاصیت فرسایش‌پذیری بالا، بسیار مؤثر است. سیستم ریشه عمیق آن باعث می‌شود که خشکسالی شدید را تحمل نماید. از تیورگراس جهت حفاظت خاک و آب، کنترل فرسایش کنار رودخانه‌ای، کنترل فرسایش ساحلی، کنترل فرسایش آبی و بادی، کاهش هرزاب، پایداری حاشیه جاده‌ها، جمع‌آوری رسوبات دانه‌ریز و درشت، تثبیت شیب‌ها و دامنه‌ها و ممانعت از زمین‌لغزش، تعییف دام، تهییه مالج جهت کنترل علف‌های هرز، تثبیت تپه‌های شنی، افزایش حاصلخیزی خاک‌های شنی، صنایع دستی، کاه‌گل پشت‌بام، تولید خشت گلی، نخ، ریسمان، طناب و مصارف پزشکی و آرایشی استفاده می‌شود (احمدی بنی و همکاران، ۱۳۹۴).

روش نمونه‌برداری

دو سری پلات مستطیلی شکل (دارای اکوکاور و خاک لخت) به ابعاد ۴ در ۱ متر در سه تکرار و به فاصله سی متر از یکدیگر مستقر گردید. در هر پلات (تیمار و خاک لخت)، شش نهال تیورگراس در یک ردیف به فاصله ۵۰ سانتی‌متر از کناره پلات و با فاصله ۵۰ سانتی‌متر از یکدیگر نشا شدند. در

انتهای فصل رویش، تعداد گیاهان ناخواسته سبز شده در هر پلات شمارش شده، توزین شدند و اثرات اکوکاور بر رشد و نمو نهال‌های و تیورگراس نیز از طریق اندازه‌گیری عمق ریشه‌دوانی، ارتفاع و قطر راج پوشش آن‌ها بررسی گردید. علاوه بر آن، دو سری پلات مستطیلی شکل (دارای پوشش اکوکاور و خاک لخت) به ابعاد ۴ در ۱ متر و در سه تکرار و به فاصله سی متر از یکدیگر نیز به منظور بررسی اثرات اکوکاور بر بخشی خصوصیات خاک مستقر گردید. پس از ۶ ماه، از هر پلات دو نمونه خاک برداشت شد و در آزمایشگاه برخی خصوصیات فیزیکی (بافت خاک، رطوبت اشباع، تخلخل)، شیمیایی (ماده آلی، ازت، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و اسیدیته) و بیولوژیک (تنفس میکروبی) خاک تعیین گردید و شاخص فرسایش‌پذیری خاک نیز محاسبه شد.

مطالعات آزمایشگاهی

پس از انتقال نمونه‌های خاک به آزمایشگاه جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی، نمونه‌ها در معرض هوای آزاد خشک گردیدند. سپس، تمامی نمونه‌های خاک بعد از کوبیدن، توسط الک ۲ میلی‌متری الک شدند. بافت خاک از روش هیدرومتری (Bouyoucos, ۱۹۶۲) و درصد رطوبت اشباع نمونه‌های خاک نیز به صورت وزنی به دست آمد (Famiglietti et al., ۱۹۹۸). تخلخل کل نمونه‌ها نیز با استفاده از جرم مخصوص ظاهری و حقیقی خاک، محاسبه گردید. شاخص فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از نسبت رس اصلاح شده^۳ (MCR) از فرمول زیر

$$\frac{\text{درصد سیلت} + \text{درصد ماسه}}{\text{درصد رس} + \text{درصد ماده آلی}} = \text{نسبت رس اصلاح شده}$$

محاسبه شد (Kumar et al., ۱۹۹۵). اسیدیته نمونه‌های خاک توسط pH متر (McLean, ۱۹۸۸)، میزان هدایت الکتریکی با استفاده از دستگاه EC متر (Page et al., ۱۹۸۷)، ماده آلی به روش والکی-بلک (Nelson & Sommers, ۱۹۸۲) و فسفر قابل جذب با استفاده از روش اولسن و همکاران (۱۹۵۴)، اندازه‌گیری شدند. مقادیر سدیم و پتاسیم تبادلی با استفاده از فلیم‌فوتومتر و مقادیر کلسیم و منیزیم تبادلی از طریق تیتراسیون به دست آمد (Page et al., ۱۹۹۲). میزان تنفس میکروبی از طریق انکوباسیون نمونه‌های خاک با سود نیم نرمال و تیتراسیون آن با اسید کلریدریک ۱/۰ نرمال تعیین شد.

^۳ Modified clay ratio

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ و از طریق آزمون t انجام گردید. پس از حذف داده‌های پرت و انتهایی (پاشا شریفی و همکاران، ۱۳۹۱)، جهت مقایسه میانگین‌ها، از آزمون t با نمونه‌های مستقل استفاده شد. بسته به معنی دار بودن ($p < 0.05$) یا نبودن ($p > 0.05$) آزمون t ، از مقدار t محاسبه شده با فرض برابری واریانس‌ها و یا مقدار t محاسبه شده بدون فرض برابری واریانس‌ها استفاده گردید.

نتایج

نتایج (جدول ۱) بیانگر آن است که کاربرد اکوکاور اثربخشی داری بر میانگین وزن پایه‌های گیاهی و تیورگراس و نیز میانگین محیط تاج پوشش آن‌ها گذاشته است ($p < 0.05$). بطوریکه میانگین وزن آن‌ها را از $23/73$ گرم به $51/56$ گرم در هر پایه گیاهی و میانگین محیط تاج پوشش آن‌ها را از 50 سانتی‌متر به $76/25$ سانتی‌متر در هر پایه گیاهی رسانده است. میزان زندگانی پایه‌های و تیورگراس نیز درنتیجه کاربرد اکوکاور افزایش معنی داری داشته ($p < 0.05$) و از $61/1$ درصد به $89/9$ درصد رسیده است (جدول ۳).

جدول ۱- میانگین خصوصیات گیاهی اندازه‌گیری شده و تیورگراس در تیمارهای مورد مطالعه

تیمار	وزن (گرم)	ارتفاع (سانتی‌متر)	طول	محیط تاج پوشش	پایه‌های
				(سانتی‌متر)	(سانتی‌متر)
اکوکاور	$51/56 \pm 4/68a$	$67/69 \pm 27/20a$	$17/13 \pm 7/31a$	$\pm 2/19a$	$88/9a$
و تیور				$\pm 2/25$	$76/25$
وتیور	$23/73 \pm 7/29b$	$49/82 \pm 24/29a$	$14/82 \pm 7/36a$	$50 \pm 3/77b$	$61/1b$

حروف نام مشابه در هر ستون نشانگر اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد می‌باشد.

در پلات‌های دارای اکوکاور، تنها شش پایه گیاهی ناخواسته مشاهده گردید اما در پلات‌های فاقد اکوکاور، تعداد بسیار بیشتری از گیاهان ناخواسته، خصوصاً گونه گیاهی *Phalaris minor* مشاهده گردید (جدول ۲).

جدول ۲- میانگین تعداد و بیوماس گیاهی اندازه‌گیری شده علفهای هرز در تیمارهای موردمطالعه

Erygarion sp	Seuada egyptica	Heli otropium sp	Phalaris minor	Alh agi sp	تیمار
۱	۰	۲	۰	۳	تعداد
۶	۰	۱۲	۰	۴۰۰	وزن (گرم)
۸	۲	۰	بیشمار	۴۵	تعداد
۴۰	۳۰۰	۰	۵۰۰	۳۳۹	وزن (گرم)
				.	

نتایج (جدول ۳) نشانگر کاهش معنی دار میانگین درصد رس، درصد رطوبت اشبع، درصد ازت کل، و افزایش معنی دار فسفر قابل جذب و منیزیم قابل تبادل خاک می باشد ($p < 0.05$) و بین میانگین سایر خصوصیات موردمطالعه، تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

جدول ۳- میانگین خصوصیات فیزیکی- شیمیابی- بیولوژیک و فرسایش پذیری خاک در تیمارهای موردمطالعه

خاک لخت	اكوکاور	تیمار	خصوصیات خاک
سیلتی کلی لومی $۲۹/۳۳ \pm ۱/۱۵a$	سیلتی کلی لومی $۲۷/۶۶ \pm ۰/۸۲a$	بافت خاک رس (%)	بافت خاک رس (%)
$۶۰/۰۰ \pm ۰a$	$۶۱/۳۳ \pm ۲/۰۶a$	سیلت (%)	
$۱۰/۶۶ \pm ۱/۱۵a$	$۱۱/۰۰ \pm ۲/۰۹a$	ماسه (%)	
$۴۶/۱۲ \pm ۵/۳۱a$	$۴۳/۸۶ \pm ۵/۷۲a$	تخلخل (%)	
$۴۲/۲۵ \pm ۰/۳۹b$	$۴۱/۰۵ \pm ۰/۷۲a$	رطوبت اشبع خاک (%)	
$۷/۵۰ \pm ۰/۰۳a$	$۷/۴۶ \pm ۰/۰۶a$	pH-log [H ⁺]	
$۴/۲۴ \pm ۰/۲۲a$	$۴/۳۸ \pm ۰/۶۷a$	EC(dSm-1)	
$۲/۰۱ \pm ۰/۶۵a$	$۲/۹۱ \pm ۰/۶۳a$	ماده آلی (%)	
$۰/۱ \pm ۰/۰۴b$	$۰/۰۶ \pm ۰/۰۱۷a$	ازت (%)	
$۴/۵۶ \pm ۶/۱۷b$	$۱۱/۴۹ \pm ۰/۲۸a$	فسفر قابل جذب (ppm)	
$۳۴۵/۳۳ \pm ۱۱۵/۳۰a$	$۳۵۱/۶۶ \pm ۱۲۹/۸۰a$	سدیم تبادلی (ppm)	
$۳۳۴ \pm ۱۲۷/۷۰a$	$۲۸۱ \pm ۱۱۵/۵۰a$	پتاسیم تبادلی (ppm)	
$۱۲/۹۳ \pm ۳/۵۰b$	$۱۹/۳۳ \pm ۳/۷۰a$	منیزیم تبادلی (ppm)	
$۱۹/۶۰ \pm ۲/۴۰a$	$۱۹/۲۶ \pm ۲/۳۰a$	کلسیم تبادلی (ppm)	
$۱/۶۴ \pm ۰/۴۸a$	$۰/۸۸ \pm ۰/۵۳a$	تنفس میکروبی (mg CO ₂ /day)	
$۲/۲۶ \pm ۰/۱۶a$	$۲/۳۶ \pm ۰/۲۴a$	فرسایش پذیری	

بحث و نتیجه‌گیری

مالج‌های آلی شامل کمپوست، کود دامی، بقایای گیاهی، فرآورده‌های درخت (پوست، خاکاره، خرد چوب)، فرآورده‌های فیبری و فرآورده‌های کاغذی (Litzow & Pellett, ۱۹۸۳; Riechers et al., ۲۰۰۷)، علاوه بر کنترل گیاهان ناخواسته، دارای مزایایی مانند حفظ رطوبت و کاهش تنفس آبی، کاهش نوسانات درجه حرارت خاک و افزودن ماده آلی و عناصر غذایی به خاک هستند (Greenly & Rakow, ۱۹۹۵). در تحقیق حاضر، رطوبت اشباع کمتر خاک در تیمار اکوکاور می‌تواند ناشی از میانگین رس کمتر آن باشد (عجمی و همکاران ۱۳۸۷).

کیفیت ماده آلی تجزیه شونده (نسبت C/N) از عوامل اثرگذار بر میزان ازت کل خاک می‌باشد (Niknahad Gharmakher et al., ۲۰۱۲). اکوکاور استفاده شده در این تحقیق، از کاغذ روزنامه‌ها و مجلات باطله تهیه شده بود و کاغذ عمده‌اً از الیاف سلولزی تشکیل شده است. لذا می‌توان چنین استنتاج نمود که کاهش معنی‌دار ازت کل خاک در تیمار اکوکاور ناشی از پایین بودن نسبت C/N در اکوکاور استفاده شده می‌باشد. استفاده از مواد آلی غنی از ازت مانند ساقه سویا همراه با کاغذ در ساخت اکوکاور به منظور احتراز از اثرات منفی کاهش ازت کل خاک در نتیجه تجزیه اکوکاور، مفید خواهد بود.

میانگین ماده آلی خاک در تیمار اکوکاور افزایش یافته است و احتمالاً می‌تواند دلیل افزایش فسفر قابل جذب در آن تیمار باشد. پوشش مواد آلی بر سطح خاکدانه‌ها امکان جذب فسفات توسط خاکدانه‌ها را تقلیل می‌دهد و لذا سبب افزایش فسفر قابل جذب در خاک می‌شود (ملکوتی، ۱۳۷۰). اسید کربنیک حاصل از تجزیه ماده آلی (اکوکاور) و افزایش رطوبت خاک به دلیل نقش مثبت اکوکاور در ممانعت از تبخیر آب (Gouin, ۱۹۸۳)، می‌تواند سبب تحرک یون منیزیم در کمپلکس تبادلی خاک شده و میزان منیزیم تبادلی خاک را افزایش دهد (ملکوتی، ۱۳۷۰).

افزایش معنی‌دار بیوماس اندام هوایی و محیط تاج پوشش نهال‌های و تیورگراس در نتیجه کاربرد اکوکاور موید نظر بیکر^۴ (۱۹۹۸) در خصوص عملکرد بالاتر و رشد رویشی بیش‌تر گیاهان در اثر کاربرد مالج می‌باشد. مالج علاوه بر کاهش دمای خاک، از طریق ممانعت از انتقال بخار آب موجود در خاک به بیرون از خاک، تبخیر آب از سطح خاک را نیز کاهش می‌دهد و با حفظ رطوبت، میزان رطوبت در دسترنس ریشه گیاه افزایش یافته (Gouin, ۱۹۸۳) و میزان فتوسنتز و جذب مواد غذایی بهبود می‌یابد (Hudu et al., ۲۰۰۲). تعدیل دما و رطوبت در منطقه رشد ریشه می‌تواند سبب رشد بهتر نهال‌های

^۴ Baker

وتیورگراس در تیمار اکوکاور در قیاس با تیمار شاهد شده باشد (Evans, ۲۰۰۰). هر خاکپوشی که دمای خاک را در طول فصل رشد بیشتر به محدوده ۱۸-۲۴ درجه سانتیگراد نزدیک کند، باعث رشد بیشتر گیاه می‌شود (Greenly and Rakow, ۱۹۹۵). از طرف دیگر، کاربرد اکوکاور باعث کاهش تعداد و بیوماس علفهای هرز شده است و درنتیجه رقابت بر سر آب و مواد غذایی نیز کاهش یافته است. از مزایای استفاده از مالج این است که رطوبت خاک در تابستان بسیار بهتر از خاک لخت، حفظ می‌شود (Foo et al., ۲۰۱۰). با توجه به فصل رشد و تیورگراس (اواسط فروردین تا اوایل آبان) و فصل بارندگی در ایران (اوایل آبان تا اوآخر اردیبهشت)، این امر می‌تواند تأثیر زیادی در رشد و نمو و تیورگراس داشته باشد.

بسیاری از گیاهان ناخواسته جهت جوانهزنی به نور نیاز دارند، ولی مالج می‌تواند از رسیدن نور به بذور آن‌ها جلوگیری نماید (Buhler et al., ۱۹۹۲). مالج با تولید یک لایه خفه‌کننده، موجب کاهش فتوسنتر و رشد گیاهچه‌های گیاهان ناخواسته نیز، می‌شود (Rahman et al., ۲۰۰۵) و می‌تواند از جوانهزنی و درنتیجه رشد گیاهان ناخواسته جلوگیری کند (Bond & Grundy, ۲۰۰۱). نتایج این تحقیق نیز نشانگر کاهش چشمگیر گیاهان ناخواسته در اثر کاربرد اکوکاور می‌باشد.

باتوجه به نتایج این تحقیق و با درنظرگرفتن اینکه مؤثرترین شکل استفاده از پوشش مالج، فرم پیوسته و ممتد آن است (نوجوان، ۱۳۸۰) و از آنجاکه شکل خردشده اکوکاور ایجاد پوشش کاملی را ننموده و امکان جوانهزن گیاهان ناخواسته از میان آن‌ها وجود دارد (راشد محصل و همکاران، ۱۳۷۵)، به همین دلیل در برنامه‌های اصلاح مراتع از طریق کاشت بوته‌های و تیورگراس، استفاده از اکوکاور به صورت نوار متصل بهم، توصیه می‌شود. مزیت مهم مالچهای کاغذی در قیاس با مالچهای پلاستیکی و نیز مالچهای زیست تجزیه‌پذیر آن است که مشکل بازیافت ندارند و به طور طبیعی تجزیه می‌شوند. کاربرد مالچهای کاغذی در مقیاسی وسیع، مشکلی است که می‌باید حل گردد. کیفیت این نوع مالچها می‌باید بهبودیافته و قیمت آن‌ها نیز می‌بایست کاهش یابد تا بتوانند با مالچهای پلاستیکی رقابت نمایند (Haapala et al., ۲۰۱۴).

منابع

- احمدی بنی، م، نیک نهاد قرماخر، ح، مارامایی، م، عظیمی، م. ۱۳۹۴. اثر گونه و تیورگراس (*Chrysopogon zizanioides*) در برخی از خصوصیات خاک (مطالعه موردنی: ایستگاه کچیک، مراوه‌تپه، استان گلستان). مرتع، ۹، (۳): ۲۶۸-۲۸۰.
- پاشا شریفی، ح، رضاخانی، س، حسن‌آبادی، ح، ایزانلو، ب، حبیبی، م. ۱۳۹۱. پژوهش‌های چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر). نشر رشد. ۸۱۰ ص.

- جنگجو، م. ۱۳۸۸. اصلاح و توسعه مراتع، چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۲۳۹ ص.
- دادار، ع. نیستانی، الف. ۱۳۸۴. روش‌های مختلف مبارزه با علف هرز نی در باغ‌های انگور. مجموعه مقالات دومین همایش علوم علوفه‌ای هرز ایران. انجمن علوم علوفه‌ای هرز ایران. ۱: ۲۰۹-۲۱۱.
- راشد محصل، م. ح. رحیمیان، ح. بنایان، م. ۱۳۸۵. علوفه‌ای هرز و کنترل آن‌ها. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۵۷۵ ص.
- غدیری، ح. ۱۳۸۱. دانش علوفه‌ای هرز (مبانی و روش‌ها). انتشارات دانشگاه شیراز. ۷۲۰ ص.
- کاشی، ع. حسین زاده، س. بابالار، م. لسانی، ح. ۱۳۷۷. اثر مالج پلی‌اتیلن سیاه و کلسیم نیترات بر رشد، عملکرد و پوسیدگی گلگاه هندوانه رقم چارلسون گری. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ۱(۴): ۹-۱۷.
- کوچکی، ع. ۱۳۸۲. به زراعی و به نزادی در زراعت دیم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۳۰۴ ص.
- عجمی، م. خرمائی، ف. ایوبی، ش. ۱۳۸۷. تغییرات برخی پارامترهای کیفیت خاک برای تغییر کاربری اراضی در موقعیت‌های مختلف شب اراضی لسی در شرق استان گلستان. تحقیقات آب و خاک ایران. ۳۹(۱): ۳۰-۳۶.
- مجتهدی، م. نیک نهادقرماخر، ح. ۱۳۹۲. تأثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. دانشگاه گندکاووس. ملکوتی، م. ج. ۱۳۷۰. کودها و حاصلخیزی خاک. مرکز نشر دانشگاهی تهران. ۸۰۰ ص.
- مرادی نژاد، ف. ۱۳۷۹. اصول باغبانی. انتشارات فرهنگ جامع. ۱۰۹ ص.
- نوجوان، م. ۱۳۸۰. اصول مبارزه با علوفه‌ای هرز. انتشارات دانشگاه ارومیه. ۴۳۰ ص.
- Abdin, O.A., Zhou, X.M., Cloutier, D., Coulman, D.C., Faris, M.A., Smith, D.L. ۲۰۰۰. Cover crop and inter row tillage for weed control in short season maize (*Zea mays*). European Journal of Agronomy, ۱۲:۹۳-۱۰۲.
- Baker, J.T. ۱۹۹۸. Interaction of poultry litter, polyethylene mulch and floating row covers on triploid watermelon, Journal of the American Society Horticultural Science, ۳۳(۵):۸۱۰-۸۱۳.
- Bond, W., Grundy, C. ۲۰۰۱. Non-chemical weed management in organic farming systems. Weed Research, ۴۱:۳۸۳-۴۰۵.
- Bot, A., Benites, J. ۲۰۰۵. The importance of soil organic matter. Key to drought – resistant soil and sustained food production. FAO Soils Bulletin, ۸۰ p.
- Bouyoucos, G.J. ۱۹۶۲. Hydrometer method improved for making particle size analysis of soils. Agronomy Journal, ۵۴: ۴۶۴-۴۶۵.
- Buhler, D.D., Gunsolus, J.L., Ralston, D.F. ۱۹۹۲. Integrated weed management techniques to reduce herbicide inputs in soybean. Agronomy Journal, 84: ۹۷۳-۹۷۸.

- Buhler, D.D. ۱۹۹۶. Development of alternative of weed management strategies. *Journal of Production Agriculture*, ۹: ۵۰۱-۵۰۴.
- Burgess, P.J., Nkomaula, J.C., Medeiros-Ramos, A.L. ۱۹۹۷. Root distribution and water use in a four -year old silvoarable system. *Agroforestry Forum*, ۸:۱۵-۱۸.
- Canals, R.M., Sebastia, M.T. ۲۰۰۷. Analyzing mechanisms regulating diversity in rangelands through comparative studies: a case in the southwestern Pyrenees. *Conservation Biology*, ۲۱(۷): ۹۶۵-۹۸۴.
- Chakraborty,D., Nagarajan,S., Aggarwal, p., Gupta,V.K., Tomar,R.K., Garg,R.N., Sahoo,R.N., Sarkar,A., Chopra,U.K., Sarma,K.S.S., Karla, N. ۲۰۰۸. Effect of mulching on soil and plant water status, and the growth and yield of wheat (*Triticum aestivum*) in a semi-arid environment. *Agricultural Water Management*, ۹۵:۱۳۲۳-۱۳۲۴.
- Chalker-Scott, L. ۲۰۰۷. Impact of mulches on landscape plants and the environment – a review. *Journal of Environmental Horticulture*, ۲۵(۴): ۲۳۹-۲۴۹.
- El-Sheikh, M.A. ۲۰۰۵. Plant succession on abandoned fields after ۲۵ years of shifting cultivation in Assuit, Egypt. *Journal of Arid Environment*, ۶۱: ۴۶۱-۴۸۱.
- Evans, E. ۲۰۰۷; Mulching trees and shrubs. North Carolina State University. <http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/consumer/factsheets/trees-new/text/mulching.html>
- Famiglietti, J.S., Rudnicki, J.W., Rodell, M. ۱۹۹۸. Variability in surface moisture content along a hillslope transect: Rattlesnake Hill, Texas. *Journal of Hydrology*, 210: ۲۵۹-۲۸۱.
- Fausett, J.B., Rom, C.R. ۲۰۰۱. The effects of transitioning a mature high-density orchard from standard herbicide ground-cover management system to organic ground-cover management systems. *Arkansas Agriculture Expert Station Research Series*, 483: ۳۳-۳۶.
- Foo, C.L. Harrington, K.C., MacKay, M.B. ۲۰۱۰. Comparison of weed control techniques to establish three ground cover species. *New Zealand Plant Protection*, 63: ۹۶-۱۰۱.
- Gaoa, J.F., Maa, K.M., Fenga, Z.W., Qia J., Fenga, Y. ۲۰۰۹. Coupling effects of altitude and human disturbance on landscape and plant diversity in the vicinity of mountain villages of Beijing, China. *Acta Ecologica Sinica*, 29 (1): ۵۶-۶۱.

- Gan, J., Zhu,Y., Wilen, C., Pittenger, D., Crowley, D. ۲۰۰۳. Effect of planting covers on herbicide persistence in landscape soils. Environmental Science and Technology, ۳۷:۲۷۷۵-۲۷۷۹.
- Ghosh, P.K., Dayal, D., Bandyopadhyaya, K.K., Mohanty, M. ۲۰۰۶. Evaluation of straw and polythene mulch for enhancing productivity of irrigated summer groundnut, Field Crops Research, ۹۹:۷۸-۸۶.
- Gouin, F.R. ۱۹۸۳. Over-mulching a national plague. Weeds, Trees and Turf, ۲۲(۹):۲۲-۲۴.
- Green, T.L., Watson. G.W. ۱۹۸۹. Effects of turf grass and mulch on establishment and growth of bareroot sugar maples. Journal of Arboriculture, ۱۵:۲۶۸-۲۷۲.
- Greenly, K., Rakow, D.A. ۱۹۹۵. The effect of wood mulch type and depth on weed and tree growth and certain soil parameters, Journal of Arboriculture, ۲۱(۵): ۲۲۵-۲۳۲.
- Haapala,T., Palonen, P., Korpela, A., Ahokas, J. ۲۰۱۴. Feasibility of paper mulches in crop production: a review. Agricultural and food science, ۲۳:۶۰ – ۷۹.
- Harrington, K.C., Bedford,T.A. ۲۰۰۴. Control of weeds by paper mulch in vegetables and trees. Newzealand. Plant Protection, ۵۷:۳۷-۴۱.
- Hobbs, R.J., Huenneke, L.F. ۱۹۹۲. Disturbance, Diversity and Invasion: Implication for Conservation. Conservation Biology, 6(3): ۳۲۴-۳۳۷.
- Hudu, A.I., Futuless, K.N., Gworgwor, N.A. ۲۰۰۲. Effect of mulching intensity on the growth and yield of irrigated tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) and weed infestation in semi- arid zone of Nigeria. Journal of Sustainable Agriculture, 21: 1: ۳۷- ۴۵.
- Jodaugiene, D., Pupaliene, R., Urboniene, M., Prankietis, V., Pranckietiene, I. ۲۰۰۶. The impact of different types of organic mulches on weed emergence. Agronomy Research, 4, ۱۹۷-۲۰۱.
- Kumar, K., Tripathi, S.K., Bhatia, K.S. ۱۹۹۵. Erodibility characteristics of Rendhar Watershed soils of Bundelkhand. Indian Journal of Soil Conservation. ۲۳:۱.۲۰۰-۲۰۴.
- Litzow, M., Pellett, H. ۱۹۸۳. Influence of mulch materials on growth of green ash. Journal of Arboriculture, 9(1): ۷-۱۱.

- McLean, E.O. ۱۹۸۸. Soil pH and lime requirement. In: Page, A.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part, American Society of Agronomy, Soil Science Society of America, Madison, Wis., Pp. ۱۹۹-۲۲۴.
- Nelson, D.W., Sommers, L.E. ۱۹۸۲. Total carbon, organic carbon and organic matter. In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part ۲, Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monograph No. ۹, ۲nd ed. American Society of Agronomy Inc., Madison, WI (Chapter ۲۹), pp. ۵۳۹-۵۷۷.
- Niknahad Gharmakher, M., Piutti, S., Machet, J.M., Benizri, E., Recous, S. ۲۰۱۲. Mineralization-immobilization of sulphur in a soil during decomposition of plant residues of varied chemical composition and S content. Plant and Soil. ۲۸۰: ۲. ۳۹۱-۴۰۴.
- Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., Dean, L.A. ۱۹۵۴. Estimation of available P in soils by extraction with sodium bicarbonate. USDA circular. ۹۳۹: ۱-۱۹.
- Page, M.C., Sparks, D.L. Woll, M.R., Hendricks, G.J. ۱۹۸۷. Kinetics and mechanisms of potassium release from sandy Middle Atlantic coastal plain Soils. Soil Science Society of America journal, ۵۱: ۱۴۶۰-۱۴۶۵.
- Page, A.L., Miller, R.H., Jeeney, D.R. ۱۹۹۲b. Methods of Soil Analysis, Part ۲. Chemical and mineralogical properties. SSSA Pub., Madison. ۱۱۵۹ p.
- Rahman, A.M., Chikushi, J., Saifizzaman, M., Lauren, J.G. ۲۰۰۵. Rice straw mulching and nitrogen of no-till wheat following rice in Bangladesh. Field Crops Research, ۹۱: ۷۱-۸۱.
- Ramakrishna, A., Hoang Minh, T., Wani, S.P., Tranh Ding, L. ۲۰۰۶. Effect of mulch on soil temperature, moisture, weed infestation, and yield of groundnut in northern Vietnam. Field Crop Research, ۹۵, ۱۱۵-۱۲۵.
- Riechers, G.H., Beyers, J.L., Robichaud, P.R., Jennings, K., Kreutz, E., Moll, J. ۲۰۰۸. Effects of Three Mulch Treatments on Initial Postfire Erosion in North-Central Arizona. USDA Forest Service Gen. Technical Report, ۱۸۹: ۱۰۷- ۱۱۴.
- Schupp, J.R., McCue, J.J. ۱۹۹۶. Effect of five weed control methods on growth and fruiting of McIntosh / M.۷ apple trees. Journal of Tree fruit production, ۱: ۱-۱۴.
- Singogo, W., Lamont, W.J., Marr, C.W. ۱۹۹۶. Fall planted crop support good yield of muskmelons. Horticulture Science, ۳۱: ۶۲-۶۶.

- Smith, M.W., Carroll, B.L., Cheary, B.S. ۲۰۰۰. Mulch improves pecan tree growth during orchard establishment. Horticulture Science, ۳۵: ۱۹۲-۱۹۵.
- Swanton, C.J., Weise, S.F. ۱۹۹۱. Integrated weed management the rationale and approach. Weed Technology, 5: 657-663.
- Taber, H.G. ۱۹۹۲. Early muskmelon production with wavelength-selective and clear plastic mulches. Horticulture technology, 3(1): 70-80.
- Teasdale, J.R., Mohler, C.L. ۲۰۰۰. The quantitative relationship between weed emergence and the physical properties of mulches, Weed Science, 48:385-392.
- Uchinoaa, H., Iwamaa, K., Jitsuyamaa, Y., Ichiyamaa, K., Sugiuraa, E., Yudatea, T., Nakamuraa, S., Gopal, J. ۲۰۱۲. Effect of interseeding cover crops and fertilization on weed suppression under an organic and rotational cropping system, ۱. Stability of weed suppression over years and main crops of potato, maize and soybean. Field Crops Research, 127: 9-16.
- Watson, G.W. ۱۹۸۸. Organic mulch and grass competition influence tree root development. Journal of Arboriculture, 14:200-203.