



دانشگاه گنبد کاووس

نشریه "حفاظت زیست‌بوم گیاهان"

دوره هفتم، شماره چهاردهم

<http://pec.gonbad.ac.ir>

بررسی برخی خصوصیات اکولوژیکی و کارکردی گیاه پونه‌سای کرک ستاره‌ای

(*Nepeta asterotricha* Retch. f.) در استان یزد

سیدمصطفی گلدان‌ساز^۱، زینب جعفریان جلودار^{۲*}، روجا صفاییان^۳، علی سنبلی^۴

^۱ دانشجوی دکتری مرتع‌داری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
^۲ دانشجوی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

^۳ استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده‌ی منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه شیراز، شیراز

^۴ دانشیار گروه بیولوژی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

چکیده

پونه‌سای کرک ستاره‌ای (*Nepeta asterotricha*) یکی از ۳۴ گونه انحصاری ایران از جنس پونه‌سای می‌باشد. در تحقیق حاضر ویژگی‌های مختلفی از جمله عوامل توپوگرافی، اقلیمی، فنولوژی، ویژگی‌های کمی پوشش و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در ۸ رویشگاه مختلف این گیاه در استان یزد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این گیاه خاک‌هایی با بافت شنی-لومی را برای پراکنش ترجیح می‌دهد. عناصر غذایی مورد بررسی شامل ازت، فسفر و پتاسیم در رویشگاه‌های مختلف در سطح یک درصد دارای اختلاف معنی‌دار بودند. اسیدیته و شوری در رویشگاه‌های مختلف به ترتیب بین ۷/۵-۸ و ۰/۶۳۳-۱/۴۷ ds/m متغیر بود. بررسی‌ها نشان داد این گیاه را در ارتفاعات بالای ۲۴۰۰ متر می‌توان مشاهده نمود. پونه‌سای کرک ستاره‌ای در مناطق مختلف با ارتفاع ۴۱/۸۷-۲۸/۴ سانتی‌متر رویش داشت و رویشگاه‌های مختلف در سطح ۱ درصد اختلاف معنی‌دار نشان دادند. باید گفت بر اساس مطالعات آماری، تراکم و فراوانی در رویشگاه‌های مختلف، اختلاف معنی‌داری را نشان ندادند. به‌طور کلی و با توجه به رویشگاه‌های مرتبط شروع رشد رویشی آن از اواسط اسفندماه آغاز و در اردیبهشت‌ماه وارد مرحله گلدهی می‌شود. با توجه به ویژگی‌های کارکردی و عملکردی گونه می‌توان نتیجه گرفت که رویشگاه‌های ده بالا و تقی‌آباد بهترین شرایط محیطی را برای گونه مذکور فراهم کرده‌اند.

واژه‌های کلیدی: پونه‌سای کرک ستاره‌ای، تغییرات پوشش گیاهی، فنولوژی، ویژگی‌های خاک

*نویسنده مسئول: jafarian79@yahoo.com

مقدمه

آگاهی از کارکرد گیاهان در شرایط مختلف در حفظ، تکثیر و ترویج برای سایر مناطق کمک‌های فراوانی را برای متصدیان اصلاح مراتع به همراه دارد. از سوی دیگر شناسایی نیازهای اکولوژیکی گیاهان در رویشگاه گونه‌ها و تعیین عوامل مؤثر بر رویش و پراکنش آن‌ها از جمله بررسی‌های ضروری در بهره‌برداری و مدیریت مراتع است. خانواده نعناعیان شامل ۲۵۸ جنس و ۶۹۷۰ گونه بوده و پراکنش و تنوع زیادی را در فلور ایران از آن خود نموده است (Rechinger et al., 1982; Hedge, 1992; Jamzad et al., 2003). باید گفت اکثر گیاهان این خانواده در صنایع عطر، قنادی‌ها و صنعت دارویی استفاده می‌شوند. همچنین در طب سنتی به‌عنوان داروهای گیاهی و در صنعت غذا به‌عنوان مواد افزودنی و افزایش طعم به دلیل بوی خوب جایگاه ویژه‌ای را دارا هستند (Tucker, 2007). جنس *Nepeta* بیش از ۲۸۰ گونه دارد که از حیث مورفولوژی، حضور در عرصه‌های طبیعی و خواص‌های اکولوژیکی تنوع گسترده‌ای دارد (Rechinger et al., 1982). این جنس در ایران ۷۵ گونه داشته که ۳۴ گونه آن از جمله *N. asterotricha* انحصاری ایران هستند (مظفریان، ۱۳۷۹؛ مظفریان، ۱۳۹۴؛ Jamzad et al., 2003). عبدالغنی و همکاران (Abdel-Ghani et al., 2011) معتقدند که در سال‌های اخیر علاقه برای بررسی‌های اکولوژیکی گیاهان سیر صعودی را داشته است. یکی از مباحث مهم در علم اکولوژی، فنولوژی (پدیده‌شناسی) است. منظور از فنولوژی، مطالعه تغییرات مراحل مهم چرخه زندگی گیاهان از قبیل: تاریخ جوانه‌زنی بذور در گیاهان یک‌ساله، شروع رشد در گیاهان چندساله، زمان ظهور برگ‌ها و ساقه، زمان گل‌دهی، میوه‌دهی (بذردهی)، رسیدن بذرها، ریزش بذرها و سرانجام پایان فصل رویشی و دوره خواب زمستانه است. نکته مهم اینجاست که فنولوژی جهت تنظیم برنامه‌های بهره‌برداری، استفاده از گیاهان دارویی، جلوگیری از برداشت بی‌موقع، از بین بردن گیاهان هرز و مهاجم، پرورش زنبورعسل، جمع‌آوری بذرها و مبارزه با آفات گیاهی بسیار لازم و ضروری است (حسینی و ابرسنجی، ۱۳۸۴). از دیگر موارد مهم در رشد گیاهان اطلاع از فاکتورهای خاکی، توپوگرافی، اقلیم و نیازهای پراکنشی آن‌ها بوده که به بهبود، حفظ و مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی کمک کرده است (Nautiyal et al., 2009). در ارتباط با این مباحث، مطالعاتی روی جنس *Nepeta* صورت گرفته که می‌توان به نتایج بررسی ویژگی‌های رویشگاهی *N. oxyodonta* در زاگرس مرکزی اشاره کرد. این گیاه در ارتفاعات ۲۸۰۰-۲۱۵۰ متر از سطح دریا با شیب ۱۰ الی ۷۵ درصد گسترش داشته و شوری خاک بین ۰/۸۵ - ۰/۳۷ میکروموس بر سانتی‌متر متغیر بوده است (Mirinejad et al., 2014). بررسی‌های اکولوژیکی *N. nuda* حاکی از گسترش گیاه در مناطق با رطوبت بالا را داشت (Pardure, 2004). نجفی و همکاران (Nadjafi et al., 2009) در بررسی *N.*

Binaludensis دریافتند این گونه در شیب‌های ۵۰ درصد رو به شمال و ارتفاع بین ۲۷۰۰-۲۳۰۰ متر از سطح دریا رویش دارد. ارتفاع این گیاه بین ۴۶ تا ۵۲ سانتی‌متر و قطر تاج آن بین ۳۹ تا ۴۲ سانتی‌متر و تراکم آن ۴ گیاه در یک مترمربع اندازه‌گیری گردید. تحقیقات آن‌ها نشان داد که رویشگاه این گونه دارای بارندگی بین ۳۷۰-۳۵۰ و متوسط حرارت سالانه ۶-۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. علاوه بر *Nepeta* سایر جنس‌ها نیز مورد بررسی‌های اکولوژیکی، مرفولوژیکی، فنولوژی قرار گرفته‌اند. از جمله می‌توان به تحقیقات بر مرزه ریشنگری *Satureja rechingeri* Jamzad اشاره نمود که نتایج آن بیان‌کننده تغییرات گیاه در اکوسیستم‌های مختلف از لحاظ نیازهای اکولوژیک و مرفولوژی بود (اسماعیلی و همکاران، ۱۳۹۵). آژیرو و شاهمرادی (آژیرو و شاهمرادی، ۱۳۸۶) با بررسی گونه *Ferula ovina* در استان تهران دریافتند، این گیاه بر روی لایه‌های آهکی، با هدایت الکتریکی کمتر از یک میلی‌موس بر سانتی‌متر، اسیدیته بین ۷ تا ۷/۷ و بافت شنی پراکنش مناسبی دارد. با بررسی *Eurotia ceratoides* مشخص شد، این گونه در مناطقی با اسیدیته ۸-۷/۸ و هدایت الکتریکی ۰/۱۲-۰/۲ دسی‌زیمنس بر متر و در ارتفاع ۱۵۰۰-۲۵۰۰ متر از سطح دریا پراکنش دارد. متوسط بارندگی و دمای سالانه در رویشگاه آن به ترتیب ۹۸/۳ میلی‌متر و ۱۴/۴ درجه سانتی‌گراد بود. در نهایت آن‌ها شروع رشد رویشی را اواسط اسفندماه و رشد گلدهی را اواخر اردیبهشت‌ماه بیان کردند. از دیگر جنس‌های مورد بررسی نیز می‌توان *Lagochilus macracanthus*، *Iris taochia*، *Acanthlimon olivieri* (Jaub & Spach)، *Erysimum amasianum*، *Alkanna hussknechtii*، *Thymra*، *Carex stenophylla* Wahl، *Verbascum cheirantifolium* Boiss.، *Boiss.*، *Verbascum songaricum* Schrenk، *spicata* L. و ویژگی‌هایی از قبیل بوم‌شناختی، بررسی خصوصیات رویشگاهی، فنولوژی و خصوصیات مرفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته‌اند (فتاحی و همکاران، ۱۳۹۲؛ کریمیان و همکاران، ۱۳۹۲؛ کریمیان و همکاران، ۱۳۹۵؛ رحیم‌فروزه و حشمتی، ۱۳۹۵؛ نادری و همکاران، ۱۳۹۵، Cansaran, 2006; Kandemir, 2006; Kandemir and Cansaran, 2010; 2007). شاید گیاهانی دومانظوره در اصلاح مراتع استفاده گردد که علاوه بر ترمیم مراتع از جنبه‌های دارویی گیاهان نیز استفاده نمود. هم‌چنین علاوه بر داشتن اطلاعات کامل در این مباحث مهم اکولوژی، حفاظت از این گونه ارزشمند دارویی مرتعی، شرایط زادآوری و بقاء گونه به صورت طبیعی حفظ شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رویشگاه‌های *N. asterotricha* از لحاظ نیازهای اکولوژیک، ویژگی‌های کارکردی و عملکردی گیاه بوده، چراکه با توجه به معطر بودن، انحصاری بودن و نبود اطلاعات کامل از آن دستیابی به این موارد لازم و ضروری به نظر می‌آید.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و فلور، رویشگاه‌های پونه‌سای کرک ستاره‌ای در استان یزد به‌عنوان تنها رویشگاه گیاه (جمزاد، ۱۳۹۱) مشخص گردید. از آنجاکه استان یزد در منطقه مرکزی ایران قرار داشته و تنها کوه اصلی آن شیرکوه می‌باشد، لذا دامنه‌های مختلف آن در چند روستا و به کمک بازدیدهای صحرائی، پرسش از صاحب‌نظران، کارشناسان و دامداران و گزارش‌های موجود، هشت رویشگاه برای گیاه تعیین شد. طول و عرض جغرافیایی مناطق مورد مطالعه، توپوگرافی شامل ارتفاع، شیب و جهت و همچنین مشخصات اقلیمی هر رویشگاه به تفکیک در جدول شماره یک قابل مشاهده می‌باشد.

جدول ۱- موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های توپوگرافی و اقلیمی رویشگاه‌های مورد بررسی

پارامتر رویشگاه	مشخصات جغرافیایی	توپوگرافی		اقلیم		
		ارتفاع (متر)	شیب (درصد)	جهت شیب	متوسط دما (سانتی‌گراد)	متوسط بارندگی
تقی‌آباد	۳۱° ۳۴' ۲۴" N ۵۴° ۰۷' ۱۴" E	۲۷۳۶	۱۶/۱۴	شمالی	۱۲/۲	۳۰۸/۷
دره شیر	۳۱° ۳۸' ۰۵" N ۵۴° ۰۱' ۴۴" E	۲۴۶۳	۹/۵۱	شمالی	۱۶/۴	۱۵۸/۶
ده بالا	۳۱° ۳۴' ۵۳" N ۵۴° ۰۵' ۲۲" E	۲۷۹۱	۱۵/۷	شمال شرقی	۱۲/۲	۳۰۸/۷
خامس‌آباد	۳۱° ۳۶' ۲۲" N ۵۳° ۵۴' ۲۱" E	۲۵۹۱	۷/۴۳	شمالی	۱۹/۶	۱۸۷/۶
زردین	۳۱° ۳۰' ۰۴" N ۵۴° ۱۴' ۱۷" E	۲۶۱۰	۲۷/۰۴	غربی	۱۷/۱	۱۷۵/۹
سانبج	۳۱° ۳۵' ۲۹" N ۵۴° ۰۰' ۲۹" E	۲۴۹۲	۵/۳	شمالی	۱۵/۳	۲۲۹/۱
طزرجان	۳۱° ۳۴' ۲۸" N ۵۴° ۰۹' ۳۰" E	۲۵۳۲	۵۵/۸۸	جنوب شرقی	۱۴/۸	۲۱۹/۵
منشاد	۳۱° ۳۰' ۵۰" N ۵۴° ۱۲' ۳۰" E	۲۳۹۹	۱۲/۸۷	شمال شرقی	۱۵/۶	۲۱۱/۸

نمونه‌برداری و اندازه‌گیری ویژگی‌های خاک: نمونه‌های خاکی از عمق ۵۰-۰ سانتی‌متری سطح خاک که این عمق محدوده پراکنش ریشه گیاه بود، با سه تکرار در هر منطقه به صورت مجزا برداشت شد. به عبارتی دیگر در مجموع ۲۴ نمونه خاکی از رویشگاه‌های هشت‌گانه جمع‌آوری شد. با استفاده از صافی دو میلی‌متری نمونه‌ها الک شده تا برای انجام آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی خاک آماده گردد. این آزمایش‌های شامل نیتروژن (بر اساس روش کجلدال)، فسفر (اولسن)، پتاسیم (شعله سنجی)، اسیدیته خاک (pH متر)، شوری خاک (EC سنج) و بافت خاک (هیدرومتری) بود (جعفری حقیقی، ۱۳۸۲).

بررسی ویژگی‌های پوششی: برای اطمینان از گیاه جمع‌آوری‌شده، مقایساتی با نمونه‌های هرباریومی موجود در پژوهشکده گیاهان دارویی شهید بهشتی تهران انجام و صحت درستی نمونه‌ها به دست آمد. در این تحقیق علاوه بر ویژگی‌های رویشگاهی، فنولوژی، اندازه تاج پوشش، تراکم، فراوانی، متوسط بیومس در هر پایه گیاهی و متوسط بیومس در هکتار موردتحقیق قرار گرفت. برای انجام مطالعات فنولوژیکی، از ابتدای فصل رویش به‌طور متوسط هر ۱۵-۱۰ روز، به سایت‌های مطالعاتی مراجعه و مراحل مختلف حیاتی گیاه مورد مطالعه که شامل شروع رشد رویشی، ظهور سنبله‌های گل، گلدهی کامل، شیری شدن بذرها، رسیدن بذرها، ریزش بذرها، ریزش برگ‌ها و آمادگی برای خواب زمستانی گیاه است، ثبت شد. برای مطالعه تغییرات پوشش گیاهی ۳ ترانسکت ۵۰ متری بافاصله ۲۵ متر از یکدیگر انتخاب و پژوهش‌ها ادامه یافت. در هر ترانسکت ۱۰ نقطه بافاصله ۵ متر از همدیگر و توسط پلات یک مترمربعی (در مجموع ۳۰ پلات یک مترمربعی) یادداشت‌برداری‌ها صورت پذیرفت. باید گفت جهت مطالعات ویژگی‌های پوشش گیاهی از گیاهان مربوط به هر پلات استفاده و اطلاعات آن ثبت گردید. آخرین مرحله از پژوهش‌های گیاهی مربوط به تاج پوشش گیاه بود که علاوه بر تاج پوشش، ارتفاع گیاه در هشت منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل آماری

مطالعات بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۸ رویشگاه و ۳ تکرار در هر رویشگاه صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (version 20) تجزیه و تحلیل شد. با مشاهده اختلافات معنی‌دار، با استفاده از آزمون LSD، در سطح احتمال ۵٪ مقایسه میانگین انجام گرفت.

نتایج

خاک: بررسی‌های خاکی نشان داد، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی در مناطق مختلف در سطح یک درصد اختلاف معنی‌دار دارند (جدول شماره ۲). با توجه به وجود اختلاف معنی‌دار، مقایسه میانگین

بین فاکتورهای مختلف خاک صورت پذیرفت. همان گونه که در جدول شماره ۳ نشان داده شده است، بیشترین نیتروژن خاک در منطقه سانچ (۰/۰۶۹٪)، دهبالا (۰/۰۶۸٪) و تقی آباد (۰/۰۶۶٪) مشاهده گردید، در حالی که دهبالا و تقی آباد با دره شیر اختلاف معنی داری را نشان ندادند. در ادامه کمترین مقدار نیتروژن در خامس آباد (۰/۰۴۳٪) و طزر جان (۰/۰۳۴٪) به دست آمد. این گیاه در محیط‌هایی با شوری ۰/۶۳۳-۱/۴۷ دسی زیمنس بر متر و اسیدیتته ۷/۵-۸ توان رویش دارد که دهبالا و تقی آباد (۷/۵) کمترین اسیدیتته را داشته و در سطح یک درصد با سایر رویشگاه‌ها اختلاف نشان دادند. بیشترین شوری در منطقه دره شیر و زردین (۱/۴۷ ds/m) و منشاد (۱/۴ ds/m) مشاهده گردید، شاید در این مناطق کاهش نسبی بارندگی موجب ماندگاری بیشتر شوری در سطوح بالایی خاک گشته است. میزان فسفر در مناطق مورد مطالعه کم بود، در حالی که حاوی مقدار بالایی از پتاسیم بودند که بیشترین مقدار پتاسیم مربوط به دهبالا (۱۶۲ mg/kg) و تقی آباد (۱۵۹ mg/kg) و کمترین مقدار در طزر جان (۵۸/۳۳) به دست آمد. همچنین بافت خاک در بیشتر رویشگاه‌ها شنی-لومی بود.

جدول ۲- تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکوشیمیایی رویشگاه‌های مورد بررسی

صفات منابع تغییر	درجه آزادی	سیلت	رس	شن	پتاسیم
تیمار	۷	۱۵۲۸/۲۸۵**	۶۵/۱۴۳**	۲۰۷۶/۰۰**	۳۹۰۹/۵۱۷۹**
خطای آزمایشی	۱۶	۷/۶۲۵	۴/۶۲۵	۶/۱۲۵	۴۷/۶۲۵
ضریب تغییرات		۱۰/۶۲۰۵	۱۴/۳۳۷۲	۴/۱۹۴۷	۵/۷۵۶۹

NS عدم معنی داری × معنی داری در سطح ۵ درصد ** معنی داری در سطح ۱ درصد

ادامه جدول (۲)

صفات منابع تغییر	درجه آزادی	فسفر	ازت	شوری	اسیدیتته
تیمار	۷	۲/۷۰۶۱**	۰/۰۰۰۵**	۰/۴۴۸۶**	۰/۱۲۳۷**
خطای آزمایشی	۱۶	۰/۳۷۴۲	۰/۰۰۰۰۴	۰/۰۲۰۸	۰/۰۱۰۸
ضریب تغییرات		۱۲/۰۰۳۸	۱۱/۴۲۲	۱۳/۹۶۸۱	۱/۳۳۸

NS عدم معنی داری × معنی داری در سطح ۵ درصد ** معنی داری در سطح ۱ درصد

جدول ۳- مقایسه میانگین ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در رویشگاه‌های مورد بررسی

پارامتر رویشگاه	اسیدیته	شوری (دسی زیمنس/متر)	ازت (%)	فسفر (میلی-گرم/کیلوگرم)	پتاسیم (میلی گرم/کیلوگرم)
تقی آباد	7/5 ± 0/06 c	0/8 ± 0/1 c	0/066 ± 0/008 abc	5/1 ± 0/44 abc	159 ± 9/16 a
دره شیر	7/8 ± 0/1 b	1/47 ± 0/11 a	0/06 ± 0/008 bcd	4/43 ± 0/42 cd	80/67 ± 3/51 d
ده بالا	7/5 ± 0/1 c	0/633 ± 0/06 c	0/068 ± 0/006 ab	6/1 ± 1/11 ab	162 ± 9/00 a
خامس آباد	8/0 ± 0/0 a	0/67 ± 0/11 c	0/043 ± 0/004 ef	3/9 ± 0/36 d	126/33 ± 7/51 c
زردین	7/8 ± 0/2 b	1/47 ± 0/23 a	0/052 ± 0/006 de	6/1 ± 0/62 ab	117/67 ± 3/51 c
سانبج	7/9 ± 0/1 ab	1/2 ± 0/17 b	0/069 ± 0/006 a	5/07 ± 0/35 bc	± 8/02 b 140/33
طزرجان	8/0 ± 0/0 a	0/633 ± 0/06 c	0/034 ± 0/008 f	3/93 ± 0/45 d	58/33 ± 6/03 e
منشاد	7/8 ± 0/12 b	1/4 ± 0/2 ab	0/056 ± 0/003 cd	6/13 ± 0/74 a	114/67 ± 5/86 c

ادامه جدول (۳)

پارامتر رویشگاه	شن (درصد)	سیلت (درصد)	رس (درصد)	بافت
تقی آباد	20 ± 1 e	62 ± 2/65 a	18 ± 2/65 b	Silt Loam
دره شیر	73 ± 1/73 bc	11 ± 3/61 c	16 ± 2 bc	Sandy Loam
ده بالا	15 ± 1 f	62 ± 2 a	23 ± 1 a	Silt Loam
زردین	62 ± 2 d	23 ± 2/65 b	15 ± 1 bcd	Sandy Loam
سانبج	70 ± 4 c	14 ± 1 c	16 ± 3 bc	Sandy Loam
طزرجان	83 ± 2 a	10 ± 2/65 c	7 ± 1 e	Loamy Sand
منشاد	73 ± 2/65 bc	14 ± 3 c	13 ± 1 cd	Sandy Loam

حروف متفاوت در هر ستون نشان‌دهنده معنی‌داری در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون LSD

فنولوژی: طبق آماربرداری‌ها، این گیاه در رویشگاه‌های مختلف مراحل فنولوژیکی متفاوتی را نشان داد، اما به‌طور کلی می‌توان گفت از اواخر اسفندماه شروع و تا اواسط مهرماه پایان مراحل فنولوژیکی از جمله ریزش بذر گیاه ادامه می‌یابد. جدول شماره ۴ به تفکیک مراحل رویشی مختلف را نشان می‌دهد.

جدول ۴- مراحل فنولوژیکی *N. asterotricha* Rech. F

		رشد رویشی												اوج گلدهی				شیری شدن بذرها				فنولوژی رویشگاه زمان							
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۱	۲	۳	۴			۵	۶	۷	۸		
																											۱۰-۱		
																												۲۰-۱۱	اسفند
																												۲۹-۲۱	
																												۱۰-۱	
																												۲۰-۱۱	فروردین
																												۳۱-۲۱	
																												۱۰-۱	
																												۲۰-۱۱	اردیبهشت
																												۳۱-۲۱	
																												۱۰-۱	
																												۲۰-۱۱	خرداد
																												۳۱-۲۱	
																												۱۰-۱	
																												۲۰-۱۱	تیر
																												۳۱-۲۱	

ادامه جدول (۴)

ریش بذر ها										ریش برگ ها										شروع و خواب زمستانی										فنولوژی	
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸										۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸										۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸										رویشگاه زمان	
																														۱۰-۱	
																														۲۰-۱۱	تیر
																														۳۱-۲۱	
																														۱۰-۱	
																														۲۰-۱۱	مرداد
																														۳۱-۲۱	
																														۱۰-۱	
																														۲۰-۱۱	شهریور
																														۳۱-۲۱	
																														۱۰-۱	
																														۲۰-۱۱	مهر
																														۳۰-۲۱	
																															آبان
																															-
																															بهمن

رویشگاه ۱: تقی‌آباد، رویشگاه ۲: دره شیر، رویشگاه ۳: ده بالا، رویشگاه ۴: خامس آباد، رویشگاه ۵: زردین، رویشگاه ۶: سانچ، رویشگاه ۷: طزرجان، رویشگاه ۸: منشاد

تغییرات پوشش: از آنجاکه تاج پوشش گیاه در حفاظت خاک نقش به‌سزایی ایفا می‌کند، لذا هرچه تاج پوشش گیاه بیشتر باشد، شرایط حفاظت از خاک زیرین بالاتر خواهد بود. باید گفت برای آماربرداری‌های پوششی، گیاهانی که دارای شاخه‌های چوبی شده بودند، مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار گرفتند، چراکه از استقرار آن‌ها اطمینان حاصل شده بود. علاوه بر این تاج پوشش بیشتر زیست‌توده بیشتر را نیز به همراه خواهد داشت. همان‌گونه که در جدول تجزیه واریانس (جدول ۵) می‌توان مشاهده نمود، تاج پوشش گیاه در مناطق مختلف با یکدیگر در سطح یک درصد، اختلاف معنی‌دار داشتند، این در حالی است که فراوانی و تراکم در مناطق مورد مطالعه تفاوت معنی‌دار از خود نشان ندادند. با توجه به جدول مقایسه میانگین‌های صورت گرفته بیشترین و کمترین تاج پوشش به ترتیب در منطقه ده‌بالا و دره‌شیر مشاهده گردید. گیاهان منطقه ده‌بالا با متوسط ۴۲/۶۳ بیشترین ارتفاع بوته را شامل شدند. در همین راستا دره‌شیر کمترین ارتفاع گیاهی (۲۸/۴ سانتی‌متر) را شامل شد. این

تفاوت‌ها می‌تواند، ناشی از رطوبت قابل استفاده گیاه در مناطق مختلف باشد و همان گونه که در توصیف مناطق مختلف مورد مطالعه ذکر شد، ده‌بالا و تقی‌آباد بیشترین بارندگی و دره‌شیر کمترین میزان بارش را در بین مناطق دارا بودند.

جدول ۵- تجزیه واریانس ویژگی‌های پوشش در رویشگاه‌های مورد بررسی

تراکم	فراوانی	ارتفاع	بزرگ‌ترین تاج پوشش	کوچک‌ترین تاج پوشش	درجه آزادی	صفات تغییر
۰/۰۵۹ ^{n.s}	۱۴۰/۴۷۷ ^{n.s}	۶۳/۰۱۱ ^{**}	۸۵/۶۸۴ ^{**}	۸۰/۸۲۲ ^{**}	۷	تیمار
۰/۰۳۰	۱۰۰/۰۰	۱۱/۷۴۴	۵/۹۶۶	۸/۴۱۵	۱۶	خطای آزمایشی
۴۰/۳۵۸۵	۴۱/۳۷۹۳	۹/۲۲۶۶	۶/۸۰۲۱	۱۰/۱۶۶۳		ضریب تغییرات

ns عدم معنی‌داری × معنی‌داری در سطح ۵ درصد ** معنی‌داری در سطح ۱ درصد

جدول ۶- مقایسه میانگین ویژگی‌های پوشش در ۸ رویشگاه

متوسط ارتفاع گیاه (Cm)	متوسط بزرگ‌ترین عرض گیاه (Cm)	متوسط بزرگ‌ترین طول گیاه (Cm)	فراوانی (درصد)	تراکم	تغییرات رویشگاه
۴۱/۸۷ ± ۸/۹۹ ab	۳۱/۰۷ ± ۷/۶۵ ab	۴۰/۶ ± ۵/۳۷ a	۳۳/۳۳	۰/۵۷	تقی‌آباد
۲۸/۴ ± ۱۰/۷۸ d	۱۷/۷ ± ۶/۳۴ d	۲۴/۹ ± ۷/۱۱ d	۱۶/۶۷	۰/۳	دره شیر
۴۲/۶۳ ± ۹/۴۸ a	۳۳/۷۶ ± ۷/۰۹ a	۴۰/۷۰ ± ۸/۰۹ a	۳۶/۶۷	۰/۷	ده بالا
۳۶/۲۷ ± ۸/۹۹ bc	۲۷/۹۳ ± ۵/۶۵ bc	۳۶/۰۷ ± ۷/۳۳ b	۲۳/۳۳	۰/۳۷	خامس‌آباد
۳۳/۷ ± ۶/۹۸ cd	۲۴/۸۷ ± ۴/۸۹ c	۳۱/۷۷ ± ۶/۸۴ c	۲۳/۳۳	۰/۳۷	زردین
۳۹/۳۳ ± ۷/۱۱ abc	۳۱/۱ ± ۷/۷۱ ab	۳۸/۸۳ ± ۶/۶۱ ab	۲۰	۰/۳۷	سانبج
۳۷/۹۷ ± ۹/۲۳ abc	۳۲/۶ ± ۵/۷۷ ab	۳۸/۷۳ ± ۷/۲۷ ab	۲۳/۳۳	۰/۵	طزرجان
۳۶/۹۷ ± ۸/۸۷ abc	۲۹/۲۳ ± ۶/۹۲ abc	۳۵/۶۷ ± ۶/۴۹ c	۱۶/۶۷	۰/۳۳	منشاد

حروف متفاوت در هر ستون نشان‌دهنده معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد

بحث و نتیجه‌گیری

اسیدیته خاک در مناطق مورد مطالعه بین ۷/۵-۸ متغیر و از حیث شوری ۰/۶۳۳-۱/۴۷ دسی زیمنس بر متر بود. هرچند فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق مختلف باهم اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد را نشان دادند؛ ولی هر منطقه با توجه به موقعیت رویشگاهی خود محل مناسبی برای رشد گونه مورد مطالعه بود چراکه تراکم و فراوانی در نقاط مختلف از لحاظ آماری تفاوتی را به همراه نداشتند. در مناطق هشت‌گانه مورد مطالعه، از لحاظ موقعیت توپوگرافی این گیاه ارتفاعات

بالای ۲۴۰۰ متر را ترجیح می‌دهد، احتمال بر آن است که در این نقاط علاوه بر پایین‌تر بودن دما میزان بارش‌ها به نسبت بیشتر و در نتیجه میزان رطوبت خاک بیشتر از دیگر مناطق است. همچنین جهت شیب انتخابی گیاه بیشتر شمالی بوده و پراکندگی مناسبی را از خود به‌جای گذاشته است. همچنین شیب‌های کمتر از ۳۰ درجه را برای پراکنش انتخاب کرده به‌جز طزرجان که در شیب ۵۵ درصد رویش یافته است. متوسط بارندگی و دما در رویشگاه‌های مختلف بین ۳۰۸/۷ - ۱۵۸/۶ میلی-متر و ۱۹/۶-۱۲/۲ درجه سانتی‌گراد متغیر بود. در مطالعات میدانی شامل تراکم و فراوانی که بر پوشش گیاهی صورت پذیرفت، مشخص گردید این گیاه تیپ غالب مناطق را شامل نمی‌شود اما از لحاظ میزان پراکنش در مناطق مختلف نسبتاً مناسب بوده و با شرایط محیطزیست خودسازگاری بالایی دارد. از لحاظ زیتوده، گیاه در رویشگاه ده‌بالا بیشترین میزان را داشت در حالی که طزرجان، منشاد و دره شیر کمترین میزان زیتوده را در مناطق نشان دادند. شاید ارتفاع از سطح دریا و میزان رطوبت در دسترس خاک در میزان بیومس گیاه اثر مستقیم داشته چراکه با افزایش ارتفاع به میزان بیومس گیاه نیز افزوده گردیده است. همچنین تقی‌آباد از لحاظ عناصر غذایی جزء مناطق مطلوب مورد مطالعه بوده و باید متذکر شد عناصر غذایی خاک نقش بسیار مهمی نه‌تنها در تولیدات اولیه بلکه در تولیدات ثانویه نیز دارند. تراکم در ده بالا و تقی‌آباد بالاترین میزان را نشان داد، پایین بودن متوسط دما و بالاتر بودن میزان بارندگی باعث افزایش تراکم گیاه و از جهتی میزان تاج پوشش گیاه و ارتفاع گیاه در این دو رویشگاه شده است. نکته مهم اینجاست علاوه بر این شرایط مواد غذایی در این مناطق به نسبت سایر مناطق بالاتر بوده و همچنین بافت خاک از نوع لومی شنی می‌باشد. اهمیت تاج پوشش از آن جهت است که با افزایش تاج پوشش پایه گیاه میزان حفاظت از خاک زیرین آن بیشتر می‌شود که باید مطابق با شرایط هر منطقه گیاهانی که شرایط رویشی بهتری را در مناطق دارند، توصیه و ترویج نمود. باید گفت با توجه به شرایط بارشی کمترین تاج پوشش گیاه در منطقه دره شیر مشاهده شد. به‌طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری نمود شرایط رویشی پونه‌سای کرک ستاره‌ای در مناطق ده بالا و تقی‌آباد به‌صورت معنی-داری چه از لحاظ خاکی و چه از لحاظ کارکرد و عملکرد اکوسیستمی رویکرد بهتری را از خود نشان داده در حالیکه در منطقه دره‌شیر این خصوصیات اکولوژیکی کارکرد پایین‌تری را به همراه داشته‌اند. این تغییرات و وابستگی‌های گیاهان در هر جنس و گونه متفاوت می‌باشد.

بررسی‌هایی که توسط سایر محققین روی *N. oxydonta* و *N. binaludensis*، *N. nuda* ارتباط با نیازهای رویشگاهی از قبیل اقلیم، خاک و توپوگرافی صورت پذیرفت، نیازهای پونه‌سای را تأیید کرده و با نتایج پژوهش فعلی مطابقت دارد (Pardure, 2004; Nadjafi et al., 2009; Mirinejad et al., 2014). در تحقیقات بر گیاه *Iris taochia* مشخص شد، این گیاه در مناطقی با بافت لومی شنی، اسیدیته نرمال و غیرشور رویش دارد (Kandemir, 2006). می‌توان این‌گونه بیان

نمود که نیاز خاکی گیاه *I. taochia* با پونه‌سای شباهت‌هایی دارد. در پژوهشی که توسط کاندمیر و کانساران (Kandemir and Cansaran, 2010) در بررسی گونه در حال انقراض *Alkanna haussknechtii* صورت پذیرفت، نتایج نشان داد، این گونه در خاک‌های لومی خنثی یا کمی قلیایی با شوری کم و آهک و ظرفیت نگهداری آب بالا رویش دارد. تحقیقات بر *Eurotia ceratoides* نیز بیانگر ارتباط مستقیم بین ارتفاع از سطح دریا با تراکم و بیومس گیاه است (گلدان‌ساز و همکاران، ۱۳۸۸). هرچند نتایج حاصله از برگ آردی با گیاه پونه‌سای مورد مطالعه همخوانی داشت؛ اما از لحاظ آماری تراکم و فراوانی در مناطق مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری را از خود نشان ندادند. همچنین قنبریان و یزدان‌پناه (Ghanbarian and Yazdanpanah, 2016) در مطالعات بوم‌شناختی ریش‌پهن دریافتند، این گیاه با افزایش ارتفاع از سطح دریا، میزان تراکم و تاج پوشش آن نیز افزایش می‌یابد. به عبارتی این محققین بیان داشتند تراکم و تاج پوشش گیاه ریش‌پهن با ارتفاع ارتباط مستقیم دارد. این نتایج در حالی است که بررسی‌ها بر گیاه مرزه ریش‌نگری نشان داد گیاه مرزه در ارتفاعات پایین‌تر تراکم و بیومس بیشتری داشته است (اسماعیلی و همکاران، ۱۳۹۵).

به‌طور کلی و با توجه به شرایط موجود از گیاه می‌توان این‌گونه گفت، پونه‌سای کرک ستاره‌ای به دلیل سازگاری‌هایی که با محیط‌های رویشی خود دارد می‌تواند به‌عنوان گیاهی مفید در مناطق مشابه معرفی شود. هرچند این گیاه علاوه بر شرایط رویشی مناسب، دارای خواص دارویی نیز بوده که بررسی‌های دارویی آن حائز اهمیت خواهد بود. با توجه به بیومس گیاه می‌توان جنبه‌های خوش‌خوراکی آن را در مراحل بعدی تحقیقات مورد بررسی قرار داد، البته باید توجه داشت، از آنجاکه گیاه مورد مطالعه گیاهی معطر هست، نقش علوفه‌ای آن باید پس از دوره رویش گیاه و به‌صورت خشک مورد بررسی قرار گیرد. همچنین این گیاه دارای گل‌های بسیار زیبایی بوده که شاید از لحاظ مسئله زنبورداری نیز مورد توجه متخصصین امر واقع شود. درنهایت باید گفت هرچه مطالعات بر گیاهانی که قابلیت‌های چندمنظوره دارند، صورت گیرد، نتایج بهتری را برای هر نوع بهره‌برداری به همراه خواهد داشت.

منابع

- اسماعیلی، ح.، هادیان، ج.، میرجلیلی، م. رضادوست، ح. ۱۳۹۵. بررسی صفات مرفولوژیکی، محتوای رزمارینیک اسید و برخی خصوصیات اکولوژیکی جمعیت‌های مختلف مرزه رشینگری (*Satureja rechingeri* Jamzad)، مرتع و آبخیزداری، ۶۹: ۱-۱۲.
- آزیر، ف.، شاهمرادی، ا. ۱۳۸۶. آت اکولوژی گونه مرتعی *Ferula ovina* در استان تهران، تحقیقات مرتع و بیابان، ۱۴(۳): ۳۵۹-۳۶۷.

- جعفری حقیقی، م. ۱۳۸۲. روش‌های تجزیه خاک، نمونه‌برداری و تجزیه‌های مهم فیزیکی و شیمیایی با تأکید بر اصول تئوری و کاربردی. چاپ اول، انتشارات ندای ضحی.
- جمزاد، ز. ۱۳۹۱. فلور ایران شماره ۷۶، آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۰۷۲ صفحه.
- حسینی، ع.، ابرسنجی، غ. ۱۳۸۴. فنولوژی ۷ گونه مرتعی بومی شورروی در ایستگاه اینچه برون گلستان، پژوهش و سازندگی، ۱۸(۴): ۸۷-۹۲.
- رحیم فروزه، م.، حشمتی، غ. ۱۳۹۵. بررسی خصوصیات بوم‌شناختی و روند تقویم رویشی *Carex stenophylla* Wahl، نشریه حفاظت زیست‌بوم گیاهان، ۴(۹): ۷۶-۶۱.
- فتاحی، ب.، ملکی، م.، یاری، ع.، صالحی، م.، بابایی، س.، حسن کاویار، ف. ۱۳۹۲. مطالعات آت اکولوژی گونه *Acantholimon oliveri* (Jaub & Spach) Boiss در مراتع کوهستانی استان همدان، نشریه حفاظت زیست‌بوم گیاهان، ۱(۱): ۱۸-۱.
- قنبریان، غ.، یزدان پناه، ز. ۱۳۹۴. مطالعه بوم‌شناسی فردی گیاه ریش‌پهن (*Platychaete aucheri* Boiss) در خشک بوم‌های جنوب فارس، مرتع و آبخیزداری، ۶۸(۴): ۸۸۴-۸۶۹.
- کریمیان، و.، وهابی، م.، فضیلتی، م.، ترکش اصفهانی، م. ۱۳۹۲. بررسی خصوصیات اکولوژیکی و مرفولوژیکی گیاه خرگوشک *Verbascum cheirantifolium* Boiss در زیست‌بوم‌های مرتعی دنا، نشریه حفاظت زیست‌بوم گیاهان، ۱(۱): ۴۸-۳۳.
- کریمیان، و.، وهابی، م.، روستاخیز، ج.، نودهی، ن. ۱۳۹۵. بررسی خصوصیات رویشگاهی گل ماهور (*Verbascum songaricum* schrenk) در زیست‌بوم‌های مرتعی زاگرس، نشریه حفاظت زیست‌بوم گیاهان، ۴(۸): ۱۰۲-۸۸.
- گل‌دان‌ساز، م.، آذرینوند، ح.، جعفری، م.، زارع چاهوکی، م. ۱۳۸۸. بررسی بوم‌شناسی فردی گونه *Eurotia ceratoides* در مراتع استپی ندوشن، مرتع، ۳(۴): ۵۷۸-۵۷۱.
- مظفریان، و. ۱۳۹۴. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. فرهنگ معاصر. ۱۳۵۰ صفحه.
- مظفریان، و. ۱۳۷۹. فلور یزد. موسسه انتشارات یزد. ۶۳۶ صفحه.
- نادری، م.، مصلح آرانی، ا.، احمدی، ر.، جعفرزاده، ع.، طهماسبی پور، ع. ۱۳۹۵. بررسی برخی از خصوصیات بوم‌شناسی گونه دارویی در حال انقراض زوفایی (*Thymbra spicata* L) در استان ایلام (منطقه تلومه، تنگ بینا و شیرپناه)، نشریه حفاظت زیست‌بوم گیاهان، ۴(۹): ۳۴-۱۷.
- Abdel-Ghani, M., Abo el-Kheir, M., Abdel-Dayem, M., Abdel-Hamid, M. 2011. Vegetation analysis and soil characteristics of five common desert climbing plants in Egypt. Turkish Journal of Botany, 35:561-580 .
- Cansaran, A., Akçin, E.Ö., Kandemir, N. 2007. A study on the morphology, anatomy and autecology of *Erysimum amasianum* Hausskn.& Bornm.

- (Brassicaceae) Distributed in Central Black Sea Region (Amasya-Turkey). International Journal of Science and Technology, 2:13-24
- Hedge, I.C. 1992. Advances in Labiatae Science, Eds. R. M. Harley, T. Reynolds, Royal Botanical Gardens, Kew, London.
- Jamzad, Z., Ingrouille, M., Simmonds, M.S.J. 2003. Three new species of *Nepeta* (Lamiaceae) from Iran. Taxon, 52:93-98.
- Kandemir, N. 2006. An Investigation on the Autecological Endemic *Iris taochia* Woronow Ex Grossh. (Iridaceae) Distributed in the North East Anatolia Region. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9:2753-2760.
- Kandemir, N., Cansaran, A. 2010. An autecological on endemic *Alkanna haussknechtii* Bornm. (Boraginaceae) Critically endangered in Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 6(5):613-618.
- Mirinejad, Sh., Hassanpour, B., Khalili, Gh., Keshavarz, K. 2014. Phenological studies and habitat characteristic of endemic species *Nepeta oxydonta* in central Zagros Mountains, Iran. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 5:558-563.
- Nadjafi, F., Koocheki, A., Honermeier, B., Asili, J. 2009. Autecology, Ethnomedicinal and Phytochemical Studies of *Nepeta binaludensis* Jamzad a Highly Endangered Medicinal Plant of Iran. Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 12:97-110.
- Nautiyal, B.P., Nautiyal, M.C., Khanduri, V.P., Rawat, N. 2009. Floral biology of *Aconitum heterophyllum* Wall. A critically endangered alpine medicinal plant of Himalaya, India. Turkish Journal of Botany, 33:13-20.
- Pardure, I. 2004. Chorological and ecological aspects of *Nepeta nuda* L. ssp. *Nuda* (Syn. *N. Pannonica* L.) From Lamiaceae nepetoideae in Romania. Vegetal Biology, 5:50-64.
- Rechinger, K.H., Hedge, I.C., Ietswaart, J.H., Jalas, J., Mennema, J., Seybold, S. 1982. Labiatae. In: Rechinger, K.H. (ed.). 'Flora Iranica', Vol. 150. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
- Tucker, A.O. 2007. Mentha: Economic uses. In: Mint: Genus Mentha. Edit. B.M. Lawrence, Taylor & Francis, Boca Raton, FL.