



Gonbad Kavous University
Journal of Plant
Ecosystem Conservation
Volume 13, Issue 27
<http://pec.gonbad.ac.ir>

Introduction to the flora of Khara Rud region in Siahkal city (Gilan province) :A perspective towards sustainable conservation

Maedeh Omidi Nowbijar^{*1}, Hossein Barani², Mohamad Rahim Forouzeh², Ahmad Abedi Sarvestani³

¹ Ph.D. in Range science and engineering, Department of Rangeland Management, Faculty of rangeland and watershed management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

²Associate Professor, Department of Rangeland Management, Faculty of rangeland and watershed management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

³Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of agricultural management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

Received: 2024/10/30 ; Accepted: 2025/05/05

Abstract

Khara Rud Rural, located in the central part of Siyahkal County in Gilan Province (covering 147.5 sq km at elevations of 24-1010 m), harbors 157 plant species (136 genera, 56 families) identified in 2023. The largest families in the region include Poaceae, Rosaceae, Asteraceae, and Lamiaceae. According to a study on the growing period, 75% of the species are perennials and 24% are annuals. The life forms are predominantly hemicryptophytes (35%) and phanerophytes (33%), reflecting a cold temperate climate and forested areas. Based on the plant geographic distribution, 27% of the species are vegetative elements of the Euro-Siberian region. 17% of these elements are Euro-Siberian, Irano-Turanian, and Mediterranean. The high presence of species with a Euro-Siberian distribution reveals the floristic connection between the Hyrcanian forests and the Euro-Siberian forests. The flora consists of 33% fodder and 82% medicinal herbs of the total vegetation. The assessment of conservation status showed 17 species with varying degrees of vulnerability and 14 endemic species. The findings of this research, in addition to providing basic information on the region, are essential for its improvement and restoration. The studied area, as a natural habitat for multiple endangered species, has a high level of biodiversity, which emphasizes its ecological value and its degradation, particularly as a result of anthropogenic factors, requires planning for its protection and natural regeneration.

Keywords: Floristic list, Life form, Chrotype, Conservation status, Gilan province

*Corresponding author: maedeh.omidi@gmail.com



دانشگاه گنبد کاووس

نشریه "حفاظت زیست بوم گیاهان"

دوره سیزدهم، شماره بیست و هفتم

<http://pec.gonbad.ac.ir>

علمی - پژوهشی

معرفی فلور منطقه‌ی خراود در شهرستان سیاهکل (استان گیلان)، چشم‌اندازی در جهت حفاظت پایدار

مأده امیددی نوبیجار^{۱*}، حسین بارانی^۲، محمدرحیم فروزه^۲، احمد عابدی سروسنانی^۳

^۱ دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی مرتع، گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

^۲ دانشیار گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

^۳ دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۲/۱۵

چکیده

دهستان خراود در بخش مرکزی شهرستان سیاهکل استان گیلان با مساحت حدود ۱۴۷/۵ کیلومترمربع در گستره‌ی ارتفاعی ۲۴ تا ۱۰۱۰ متر از سطح دریا قرار دارد. برای مطالعه فلور منطقه، نمونه‌های گیاهی طی سال ۱۴۰۲ جمع‌آوری و با استفاده از منابع معتبر فلورستیک در مجموع ۱۵۷ گونه، متعلق به ۱۳۶ جنس از ۵۶ تیره شناسایی شد. بزرگ‌ترین تیره‌های منطقه شامل *Rosaceae*، *Poaceae*، *Asteraceae* و *Lamiaceae* است. با توجه به بررسی دوره رویشی ۷۵ درصد گونه‌ها، چندساله و ۲۴ درصد، یک‌ساله هستند. از نظر شکل زیستی، ۳۵ درصد همی‌کریپتوفیت و ۳۳ درصد فانروفیت هستند. درصد بالای همی‌کریپتوفیت‌ها نشان‌دهنده‌ی اقلیم معتدل سرد و فراوانی فانروفیت‌ها با وضعیت طبیعی پوشش گیاهی جنگلی همخوانی دارد. بر اساس توزیع جغرافیای گیاهی، ۲۷ درصد از گونه‌ها عنصر رویشی ناحیه ارو - سیبری، ۱۷ درصد ناحیه ارو - سیبری، ایران - تورانی و مدیترانه‌ای هستند. حضور زیاد گونه‌هایی با پراکنش اروپا - سیبری ارتباط فلورستیک جنگل‌های هیرکانی را با جنگل‌های اروپا - سیبری آشکار می‌کند. گیاهان علوفه‌ای و دارویی منطقه به ترتیب ۳۳ و ۸۲ درصد از کل فلور تشکیل می‌دهند. بررسی وضعیت حفاظتی ۱۷ گونه با درجات مختلف آسیب‌پذیری و ۱۴ گونه بومی را نشان می‌دهد. نتایج این تحقیق علاوه بر اطلاعات پایه و شناختی از منطقه در امر اصلاح و احیا ضروری است. منطقه مورد مطالعه به عنوان زیستگاه طبیعی گیاهان چند منظوره و در معرض خطر است که میزان تنوع گونه‌ای آن بیانگر ارزش اکولوژیک و تخریب آن به ویژه توسط عوامل انسانی نیازمند برنامه‌ریزی به منظور حفاظت و تلاش در جهت احیای طبیعی است.

واژه‌های کلیدی: لیست فلورستیک، فرم زیستی، کروتیپ، وضعیت حفاظتی، استان گیلان

مقدمه

بوم‌شناختی آن منطقه است؛ زیرا گیاهان موجودات پابرجایی هستند که در درازمدت کلیه‌ی شرایط و رخدادهای محیط‌زیست را تحمل کرده و با تنش‌های محیط زیستی سازگار شده‌اند (امیری و جبارزاده، ۱۳۸۹). نام هر گیاه در واقع کلیدی است که با آن درچه‌ای بر زیست‌شناسی آن گشوده می‌شود (صلاحی و همکاران، ۱۳۹۳). امروزه مطالعات فلورستیک از اهمیت بالایی به ویژه در مناطق جغرافیایی با گیاهان ناشناخته، حفاظت شده و نقاط کلیدی در زمینه تنوع زیستی برخوردار است. همچنین در مناطقی که گیاهان آن‌ها به خوبی شناخته

گیاهان برای انسان‌ها و سایر گونه‌ها، پناهگاه، غذا و دارو فراهم می‌کنند و از اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی ارزشمندی برخوردارند (Alsobeai, 2024). حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی مستلزم شناخت اجزای کامل اکوسیستم‌های طبیعی و بررسی روابط موجود بین اجزای آن از جمله پوشش گیاهی و فلور یک منطقه می‌باشد (رستم‌پور، ۱۳۹۷). به‌طور کلی، پوشش گیاهی هر منطقه یکی از مهم‌ترین پدیده‌های نمود چهره و سیمای طبیعت و بهترین راهنمای قضاوت درباره عوامل

*نویسنده مسئول: maedeh.omidi@gmail.com

شده‌اند نیز این مطالعات همچنان راهگشا است (Wagensommer, 2023). شکل زیستی گیاهان علاوه بر وابسته بودن به خصوصیات ژنتیکی به عوامل محیطی نیز بستگی دارد (رستم پور، ۱۳۹۷) همچنین با توجه به آن می‌توان شرایط آب و هوایی یک منطقه را پیش‌بینی کرد. سیستم طبقه‌بندی شکل زیستی، سیستم رانکائرمی^۱ باشد. در این روش گونه‌های گیاهی بر اساس افزایش حفاظت از جوانه‌ها به ترتیب به فانروفیت^۲، کاموفیت^۳، همی کریپتوفیت^۴، کریپتوفیت^۵ و تروفیت^۶ تقسیم می‌شوند. پراکنش جغرافیایی گیاهان هر منطقه، وابستگی عناصر رویشی آن منطقه را به نواحی مختلف رویشی مانند ایران-تورانی، مدیترانه‌ای و غیره نشان می‌دهد (یاری و همکاران، ۱۳۹۷) که با تکامل گیاهان در دوران گذشته زمین‌شناسی و وضعیت جغرافیایی آن دوران ارتباط مستقیم دارد (عادل و همکاران، ۱۳۹۳). تنوع فلور کشور ایران مدیون پیشینه پوشش گیاهی و پتانسیل تکاملی آن می‌باشد. همچنین تضاد شدید بین ارتفاع، رطوبت و دما همراه با تغییرات بارندگی و شرایط خاکی در حیات گیاهی کشور، تنوع و غنای زیادی را به وجود آورده است (آزادبخت و قهرمانی‌نژاد، ۱۴۰۲). هر روزه بر تعداد گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض افزوده می‌شود و با توجه به گسترش فعالیت‌های انسانی، شناسایی هر چه سریعتر آن‌ها در مناطق مختلف و برنامه ریزی در جهت حفظ آن ضرورت دارد (نوریانغدی و همکاران، ۱۳۹۹). همچنین گیاهان بومی و انحصاری، ذخایر ژنتیکی ارزشمند هر منطقه محسوب می‌شوند و به دلیل دارا بودن صفات ریخت شناسی مطلوب، مقاومت به آفات و سازگاری به شرایط اکولوژیک از اهمیت خاصی برخوردارند (مفیدنژاد و همکاران، ۱۴۰۲).

شناسایی گونه‌های گیاهی هر منطقه بازتابی از عوامل مختلف اکوسیستمی است (سلیمان‌پور و حاتمی، ۱۳۹۹) و مطالعات فلورستیک مانند شناسنامه‌ای وجود گیاهان و وضعیت آن‌ها را نشان می‌دهد. مطالعات پوشش گیاهی به‌طور اختصاصی و محلی اهمیت ویژه‌ای دارد که از آن جمله می‌توان به شناخت دقیق و علمی گیاهان، امکان دسترسی به گونه‌های گیاهی خاص در محل و زمان معین، تعیین پتانسیل و قابلیت‌های رویشی منطقه، امکان افزایش

تراکم گونه‌ها، شناسایی گونه‌های مقاوم، مهاجم، در حال انقراض و کمک به حفظ آن‌ها، شناسایی توان ژنتیکی گیاهان، کمک به تعیین پوشش گیاهی کشور، امکان دستیابی به گونه یا گونه‌های جدید گیاهی و شناسایی عوامل مخرب را نام برد (محرابیان و همکاران، ۱۳۸۷؛ حسینی، ۱۳۹۰؛ رضوی و حسن عباسی، ۱۳۹۱؛ قلی‌پور و همکاران، ۱۳۹۶؛ یاری و همکاران، ۱۳۹۷). این مطالعات عامل مؤثری در سنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش‌بینی وضعیت آینده‌ی منطقه به شمار می‌رود و پایه علوم کاربردی از جمله جامعه‌شناسی گیاهی، جغرافیای گیاهی، گیاه‌شناسی بومی، اقلیم زیستی، جنگل‌شناسی و جنگلداری، مرتع‌داری، گیاهان دارویی و مدیریت محیط‌زیست است. اقدامات مدیریتی، برنامه‌ریزی راهبردی، حفاظت از تنوع زیستی و احیای پوشش گیاهی تنها با شناخت عمیق از تعداد و نوع گونه‌ها و غنای فلوریستی یک منطقه کارآمد و مؤثر خواهند بود (صلاحی و همکاران، ۱۳۹۳؛ قلی‌پور و همکاران، ۱۳۹۶؛ یاری و همکاران، ۱۳۹۷؛ سلیمان‌پور و حاتمی، ۱۳۹۹؛ Wagensommer, 2023؛ Alsobeai, 2024؛ آزادبخت و قهرمانی‌نژاد، ۱۴۰۲؛ مفیدنژاد و همکاران، ۱۴۰۲)

فلور غنی و متنوع ایران از دیرباز مورد مطالعه و نمونه‌های گیاهی فراوانی نیز جمع‌آوری شده است اما هنوز مناطق بسیاری وجود دارند که پوشش گیاهی آن‌ها کمتر بررسی و به آن توجه شده است. با توجه به گوناگونی زیاد رویشگاه‌ها و غنای بالای آن، انجام این نوع مطالعات در اقصی نقاط کشور ایران از اهمیت زیادی برخوردار هستند. از جمله پژوهش‌های انجام‌شده می‌توان به مطالعات محرابیان و همکاران (۱۳۸۷) در رویشگاه حفاظت‌شده‌ی مند در استان بوشهر، امیری و جبار زاده (۱۳۸۹) در حوزه آبخیز زنگلانلو در استان خراسان رضوی، حسینی (۱۳۹۰)، رضوی و حسن عباسی (۱۳۹۱) در منطقه‌ی سرعلی آباد و فاضل‌آباد استان گلستان، صلاحی و همکاران (۱۳۹۳)، حوزه نکارود استان مازندران، نوروزی هارونی و باده‌یان (۱۳۹۵) رویشگاه‌های انجیلی در شهرستان نور استان مازندران، آخوند نژاد و همکاران (۱۳۹۵)، مراتع شفت در استان گیلان، قلی‌پور و همکاران

⁴ Hemicryptophyte

⁵ Cryptophyte

⁶ Therophyte

¹ Raunkiare

² Phanerophyte

³ Chameophyte

گياهان داروى مرتعى و جنگلى برخوردار است. بررسى‌هاى علمى موجود نشان مى‌دهد كه هنوز مطالعه جامعى براى شناسايى و معرفى فلور خارود انجام‌نشده است. با توجه به اهميت شناخت فلوريستىكى، هدف از تحقيق حاضر بررسى فلور، شناخت دقيق گونه‌هاى گياهى، شكل زيستى، پراكنش جغرافيايى، مصارف گياهان و شناسايى گونه‌هاى در معرض خطر است.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

دهستان خارود در بخش مركزى شهرستان سياهكل استان گيلان و در گستره‌ى ارتفاعى ۲۴ تا ۱۰۱۰ متر بالاتر از سطح دريا قرار دارد. اين منطقه از شمال به دهستان لقمجان شهرستان لاهيجان، از غرب به دهستان سراوان شهرستان رشت و از شرق و جنوب به دهستان توتكى و ديلمان شهرستان سياهكل محدود مى‌شود (شكل ۱). مختصات جغرافيايى متوسط آن ۳۷ درجه و ۴ دقيقه و ۹ ثانيه شمالى و ۴۹ درجه و ۴۴ دقيقه و ۸ ثانيه شرقى است. اين دهستان با حدود ۱۴۷/۵ كيلومتر مربع وسعت، حدود ۶۷۲۳ نفر جمعيت را در خود جاى داده و از ۳۹ روستا به مركزيت روستاى خارود تشكيل شده است (سرشمارى نفوس و مسكن، ۱۳۹۵) و (نقشه توپوگرافى ايران، ۱۴۰۳). رودخانه خارود ديسام يكي از رودخانه‌هاى پراب حوزه درياى خزر از دهستان خارود سرچشمه مى‌گيرد؛ جنگل ملكرود در اين ناحيه قرار دارد و در مجاورت منطقه‌ى شكارممنوع خورگام درفك است. شغل اصلى مردم اين منطقه دامدارى گاو و گوسفند از نژاد تالشى، شالى‌كارى، كشت چاى، مركبات، فندق، نوغاندارى، زنبوردارى و جمع‌آورى گياهان داروى است.

وضعيت توپوگرافى در شهرستان سياهكل از نظم ارتفاعى خاصى برخوردار است و شامل واحدهاى جلگه‌اى، كوهپايه‌اى، كوهستانى است. به‌طوركلى هرچه از طرف شمال شهرستان به‌طرف جنوب آن پيش مى‌رويم بر ارتفاع افزوده مى‌شود تا جايى كه در ارتفاعات دهستان پيركوه به ۲۴۸۳ متر مى‌رسد. پوشش گياهى منطقه برحسب تغيير ميزان ارتفاع از حالت جنگلى تا مراتع و علفزارهاى متراكم متغير است. بخش جلگه‌اى شهرستان كه شهر سياهكل در آن واقع شده است تماماً از مزارع برنج و چاى پوشيده شده است. در بخش كوهپايه اين شهرستان در ارتفاعات پايين

(۱۳۹۶)، تنوع گياهى دهستان زارمرو در شهرستان نكا استان مازندران، يارى و همكاران (۱۳۹۷)، مراتع بيلاقى چهارباغ استان گلستان، رستم‌پور (۱۳۹۷)، منطقه‌ى حفاظت‌شده شاسكوه، خراسان جنوبى، قربانى و مولائى شام اسبى (۱۳۹۷)، مراتع جنوب شرقى سبلان، نورياغدى و همكاران (۱۳۹۹)، گياهان در معرض خطر شهرستان گاليكش استان گلستان، سليمان‌پور و حاتمى (۱۳۹۹)، حوزه‌ى آبخيز مهارلو استان فارس، مولائى شام اسبى و همكاران (۱۴۰۰) مراتع خلخال در استان اردبيل، مفيدنژاد و همكاران (۱۴۰۲)، گياهان داروى حاشيه جنوبى شهرستان لنگرود استان گيلان، آزادبخت و قهرمانى‌نژاد (۱۴۰۲) منطقه حفاظت شده‌ى هزار جريب، اسدى و همكاران (۱۴۰۲) دهستان آلاداغ در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالى و رحمانى راد و همكاران (۱۴۰۳)، حوزه‌ى آبخيز داماش اشاره كرد.


استان گيلان در شمال ايران يكي مناطق پرباران كشور است كه شرايط توپوگرافى متنوع ساحلى، دشتى، جلگه و كوهستانى آن باعث گرديده تا اين استان از پوشش گياهى غنى برخوردار باشد. با توجه به منابع موجود گياه‌شناسى ايران در گيلان، حدود ۱۰۰۰ گونه گياهى وجود دارد (اكبرزاده و همكاران، ۱۳۸۹). دامنه‌هاى شمالى كوه‌هاى البرز از سواحل درياى كاسپين تا ارتفاع ۲۰۰۰ متر از جنگل‌هاى هيركانى پوشيده شده است. اين مناطق كه جزء جنگل‌هاى معتدله‌ى برگ‌ريز محسوب مى‌شوند از بازماندگان جنگل‌هاى دوران سوم زمين‌شناسى است (نوائيان و همكاران، ۱۳۹۸). اين جنگل‌ها به دليل برخوردارى از درجه حرارت مناسب، بارش‌هاى منظم، شرايط متفاوت توپوگرافى و نزديكى به دريا شرايط مناسبى را براى آشنيان اكولوژيك گونه‌هاى گياهى فراهم كرده و بوم‌سازگان جنگلى خزرى يكي از آخرين باقيمانده‌هاى جنگل‌هاى پهن‌برگ طبيعى دنيا است (بخشنده ناورود و همكاران، ۱۳۹۵). موقعيت مراتع اين استان در جهت جغرافيايى غرب به شرق از دره‌ى سپيدرود تا توده‌ى كوهستانى سماموس كشيده شده است (نوائيان و همكاران، ۱۳۹۸). دهستان خارود در بخش مركزى شهرستان سياهكل از استان گيلان و يكي از مراكز مهم دامدارى در شرق گيلان محسوب مى‌شود. بخشى از مراتع و جنگل‌هاى اين منطقه به‌عنوان محل قشلاق گذرانى و ميان‌بند دامداران كوهپايه محسوب مى‌شوند و از دامنه‌ى گسترده‌اى از

باغات و جنگل‌های مخلوط و در ارتفاعات بالاتر تنها اراضی جنگلی وجود دارد. در بخش کوهستانی تا ارتفاع ۱۵۰۰ متری جنگل و به تدریج مرتع قرار دارد. خاک‌های تشکیل‌شده در بخش باریکی از شمال شهرستان عمدتاً حاصل جلگه آبرفتی رودخانه‌ای و رسوبی است که از خاک‌های عمیق تا نیمه عمیق تشکیل یافته است و برای کشت برنج و چای استفاده می‌شود. بقیه خاک‌ها از نوع خاک‌های کوهستانی و فلاتی است که ویژگی‌های بارز آن عمق و بیرون‌زدگی‌های بدون پوشش خاک است. در بخش پوشش مترکم جنگلی خاک‌های اسیدی کم‌عمق تا عمیق با بافت سنگین مشاهده می‌شود (فتح‌الله زاده، ۱۳۸۹). با توجه به داده‌های دو ایستگاه سینوپتیک تکمیلی لاهیجان و دیلمان، میانگین دمای و بارش سالانه منطقه ۱۶ درجه سلسیوس و ۱۲۵۰ میلی‌متر می‌باشد. آب‌وهوای منطقه براساس طبقه‌بندی اقلیمی دومارتن اصلاح‌شده بسیار مرطوب معتدل و بسیار مرطوب سرد است. با توجه به پارامترهای اقلیمی در ایستگاه لاهیجان از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد دوره خشک سال در این ایستگاه و مابقی سال نیز از نظر شاخص آمبروترمیک به‌عنوان دوره مرطوب معرفی می‌شود (گروه توسعه هواشناسی کاربردی، ۱۴۰۲).


روش شناسی تحقیق

به‌منظور معرفی فلور پس از جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی عرصه مورد مطالعه، به دلیل تنوع توپوگرافی محدوده جغرافیایی، سه کمربند ارتفاعی شامل ناحیه پست و جلگه‌ای (کمتر از ۱۰۰ متر) و کوهپایه‌ای (۵۰۰-۱۰۰) و

نیمه کوهستانی و مرتفع (بالتر از ۵۰۰ متر) در نظر گرفته شد و سه سایت نمونه برداری با توجه به جاده‌های دسترسی و حضور گونه‌های مورد مطالعه نهایی گردید. سپس نمونه برداری در منطقه معرف با همراهی افراد بومی آشنا با گیاهان و طی مراجعات میدانی در طی اسفند ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ (فصول رویش) به روش پیمایش زمینی و مشاهده به صورت تصادفی با تهیه لیست از گونه‌های شناخته شده و نشده، عکاسی و جمع‌آوری گیاهان انجام شد. نمونه‌های گیاهی پس از پرس و خشک شدن با استفاده از منابع مختلف شامل، فلور رنگی ایران و فرهنگ‌نامه‌های گیاهان ایران به‌طور دقیق شناسایی شدند. پس از تهیه فهرست گونه‌های منطقه، گونه‌ها از لحاظ فرم زیستی، طول عمر، کورولوژی، گونه‌های انحصاری، در معرض خطر و مصارف بررسی و گزارش شدند. شکل‌های زیستی گیاهان منطقه بر مبنای سیستم طبقه‌بندی رانکائر و بر اساس موقعیت جوانه‌های رویشی پس از سپری کردن فصل نامساعد برای رشد بنا شده است. مناطق انتشار گونه‌ها، گونه‌های انحصاری، در معرض خطر و مصارف نیز با استفاده از منابع معتبر تعیین شدند (قهرمان، ۱۳۷۲؛ علیها، ۱۳۷۴؛ توکل، ۱۳۸۷؛ اکبرزاده و همکاران، ۱۳۸۹؛ مظفریان، ۱۳۹۷؛ مظفریان، ۱۳۹۹؛ Ghorbanalizadeh & Akhani, 2020; Zohary, 1973; Categories Raunkiaer, 1934 1994). (Red list,



شكل ۱- موقعيت منطقه مورد مطالعه، دهستان خرارود، شهرستان سياهكل، استان گيلان



شكل ۲- نمودار دما - بارش (منحنى آمبروترميك) ايستگاه سينوپتيك تكميلى شهرستان لاهيجان (۱۴۰۰-۱۳۸۲)
(گروه توسعه هواشناسى کاربردى، ۱۴۰۲)

نتايج

هستند (شكل ۳). با توجه به دوره رويشى گياهان دهستان خرارود از ۱۵۷ گونه گياهى شناخته شده، ۱۱۷ گونه (۷۵ درصد) چندساله، ۳۸ گونه (۲۴ درصد) يكساله و دو گونه گياهى (۱ درصد) دوساله مى باشد (شكل ۴). همچنين ۵۶ درصد گونه ها متعلق به بازه ارتفاعى كمتر از ۱۰۰ متر، ۲۵ درصد ۵۰۰-۱۰۰ متر و ۱۹ درصد بالاتر از ۵۰۰ متر هستند.

در طيف زيستى همى كرىپتوفيت ها با فراوانى ۳۵ درصد شكل زيستى غالب بوده اند و فانروفيت ها، تروفيت ها،

در مجموع ۱۵۷ نمونه گياهى از ۱۳۶ جنس و ۵۶ تيره از دهستان خرارود شناسايى گرديد (جدول ۲) و (شكل هاى ۱۰-۱۳). از اين تعداد ۱۱۸ گونه متعلق به نهان دانگان دولپه اى، ۳۳ گونه نهان دانگان تك لپه، ۴ گونه نهان زادگان آوندى و يك گونه جزء باز دانگان مى باشند (جدول ۱). بزرگ ترين خانواده هاى گياهى به ترتيب Poaceae با ۲۳ گونه، Rosaceae با ۱۷ گونه، Asteraceae با ۱۴ گونه و Lamiaceae با ۱۱ گونه

عنصر رویشی ناحیه ارو - سیبری و ایران- تورانی، ۴ درصد
عنصر رویشی ارو-سیبری و مدیترانه‌ای، ۲ درصد عنصر
رویشی ایران -تورانی و مدیترانه‌ای و ۱ درصد نیمه
جهان‌وطنی هستند (شکل ۷).


گیاهان علوفه‌ای و دارویی منطقه به ترتیب ۳۳ و ۸۲
درصد از کل فلور منطقه تشکیل می‌دهند (شکل‌های ۸ و
۹). وضعیت حفاظتی گونه‌های گیاهی بر اساس معیارهای
سازمان (IUCN, 1981) نشان داد که یک‌گونه‌ی گیاهی
در معرض خطر انقراض (EN)، ۳ گونه آسیب‌پذیر (VU) و
۱۳ گونه نسبتاً آسیب‌پذیر (LR) هستند. همچنین ۱۴ گونه
انحصاری و بومی ایران در حوزه‌ی هیرکانی وجود دارند
(جدول ۳).

کریپتوفیت‌ها و کامفیت‌ها به ترتیب با فراوانی ۳۳ درصد،
۱۷ درصد، ۱۱ درصد و ۴ درصد در رتبه بعدی قرار دارند
(شکل ۵). بررسی گستره‌ی شکل‌های رویشی در بین
کمرنده‌های ارتفاعی، شیبی از تغییرات را به‌ویژه در خصوص
شکل زیستی فانروفیت، همی کریپتوفیت و تروفیت‌ها نشان
می‌دهد. به‌طوری در ارتفاع بالاتر با کاهش فانروفیت‌ها و
تروفیت‌ها و افزایش همی کریپتوفیت‌ها مواجه هستیم (شکل
۶).


از نظر پراکنش جغرافیایی، ۲۷ درصد گونه‌ها مربوط به
ناحیه ارو- سیبری، ۱۷ درصد به‌طور مشترک مربوط به سه
ناحیه ارو - سیبری، ایران- تورانی و مدیترانه‌ای، ۱۵ درصد
گونه‌ها چند ناحیه‌ای، ۱۳ درصد جهان‌وطنی، ۸ درصد
اندمیک، ۷ درصد ایران- تورانی، ۶ درصد به‌طور مشترک




شکل ۳ - بزرگ‌ترین تیره‌های گیاهی دهستان خرارود




شکل ۴ - نمودار درصد طول عمر گیاهان در فلور دهستان خرارود



شکل ۵ - نمودار درصد شکل‌های زیستی فلور دهستان خرابود




شکل ۶ - نمودار گستره شکل‌های زیستی در کمربندهای ارتفاعی مختلف دهستان خرابود




شکل ۷ - نمودار درصد پراکنش جغرافیایی گیاهان در دهستان خرابود. ES =

اروپا- سيبى، IT = ایرانى-تورانى، M = مدیترانه‌ای، PL = چند ناحیه‌ای، Cos = جهان‌وطنی، SCO = نیمه جهان‌وطنی، End = بومی و انحصاری



شکل ۸ - نمودار درصد گیاهان علوفه‌ای در دهستان خراود



شکل ۹ - نمودار درصد گیاهان دارویی در دهستان خراود

جدول ۱- تعداد تیره، جنس و گونه‌ها در گروه‌های گیاهی در منطقه‌ی خراود

گونه	جنس	تیره	گروه گیاهی
۱۱۸	۱۰۱	۴۳	نهان‌دانگان دولپه
۳۳	۳۰	۹	نهان‌دانگان تک‌لپه
۴	۴	۳	نهان زادگان آوندی
۱	۱	۱	بازدانگان
۱۵۷	۱۳۶	۵۶	مجموع

جدول ۲- لیست فلورستیک، شکل‌های زیستی و کورولوژی گیاهان در منطقه‌ی خراود

طول عمر: A = یک‌ساله، D = دوساله، P = چندساله

شکل زیستی: Ph = فانروفیت، Ch = کامفیت، Cr = کریپتوفیت، He = همی کریپتوفیت، Th = تروفیت

کوروتیپ: ES = اروپا-سیبری، IT = ایرانی-تورانی، M = مدیترانه‌ای، PL = چند ناحیه‌ای، Cos = جهان‌وطنی،

SCo = نیمه جهان‌وطنی، End = بومی و انحصاری

گروه گیاهی: نهان‌دانگان دولپه‌ای: Angi(Dico) نهان‌دانگان تک‌لپه‌ای: Angi (Mono) نهان زادگان آوندی: PT بازدانگان: GYM

تیره	نام علمی	نام فارسی	شکل زیستی	کوروتیپ	طول عمر	گروه گیاهی	پراکنش (ارتفاع از سطح دریا)	مصارف علوفه‌ای	مصارف دارویی
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i>	شوند	Cr	PL	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	قاشق‌واش	Cr	PL	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	-	*
Amaranthaceae	<i>Amaranthus viridis</i>	تاج‌خروس باریک	Th	Cos	A	Angi(Mono)	<۱۰۰	-	*
Apiaceae	<i>Eryngium planum</i>	اناریچه	He	ES,IT,M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Eryngium billardieri</i>	زول	He	ES,IT,M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*

ادامه جدول ۲

تیره	نام علمى	نام فارسى	شکل زیستى	کروتیپ	طول عمر	گروه گیاهى	پراکنش (ارتفاع از سطح دریا)	مصارف علفه اى	مصارف داروى
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i>	پیچ تلگرافى	He	ES,IT, M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	-
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i>	خاس	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	*	-
Araliaceae	<i>Houx Hedera colchica C. Koch</i>	داروست	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	-
Asparagaceae	<i>Danae racemosa</i>	همیشک	Ph	ES	P	Angi(Mono)	۱۰۰-۵۰۰	*	*
	<i>Ruscus hyrcanus</i>	کوله خاس	Ph	End	P	Angi(Mono)	۱۰۰-۵۰۰	*	*
Asteraceae	<i>Artemisia annua</i>	درمنه یکساله	Th	ES-IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Cirsium vulgare</i>	گنجر	He	PL	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Matricaria chamomilla</i>	بابونه آلمانى	He	PL	A	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Achillea millefolium</i>	بومادران	He	Cos	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Centaurea hyrcanica</i>	گل گندم خزرى	He	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	*
	<i>Helisnthus tuberosus</i>	یرالماسى	Cr	PL	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Taraxacum officinale</i>	قاصدک معمولى	He	ES-IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Cichorium intybus</i>	کاسنى	He	ES-IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Onopordum acanthium</i>	خار پنبه	He	Cos	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Silybum marianum</i>	شکر تیغال	He	ES,IT, M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>conyza canadensis</i>	پیر بهار	Th	Cos	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Sonchus asper</i>	شیر تیغک	Th	Cos	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Tragopogon pratensis</i>	شنگ	He	ES-IT	D	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Anthemis cotula</i>	بابونه بهارى	He	ES-IT	A	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*

ادامه جدول ۲

تیره	نام علمی	نام فارسی	شکل زیستی	کروتیپ	طول عمر	گروه گیاهی	پراکنش (ارتفاع از سطح دریا)	مصارف علوفه ای	مصارف دارویی
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i>	فندق	Ph	ES	P	Angi(Dico)	-	-	*
	<i>Alnus subcordata</i>	توسکا	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	-	*
	<i>Alnus glutinosa</i>	ییلاقی توسکا	Ph	ES,IT,M	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Carpinus betulus</i>	قشلاقی ممرز	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	-	*
Boraginaceae	<i>Myosotis lithospermifolia</i>	فراموشم نکن	Th	PL	A	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	-	*
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i>	علف چشمه	He	PL	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Descurainia sophia</i>	خاکشیر	Th	Cos	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Alyssum minus</i>	قدومه	Th	Cos	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	کیسه کشیش	Th	Cos	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Buxaceae	<i>Buxus hyrcana</i>	شمشاد جنگلی	Ch	End	P	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	-	*
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i>	ته‌استکان ی خوراکی	He	ES	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Campanula rapunculoides</i>	ته‌استکان ی برگ گزنه‌ای	He	ES	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Caprifoliaceae	<i>Lonicera caprifolium</i>	پیچ امین الدوله	Ph	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Caryophyllaceae	<i>Dianthus hyrcanicus</i>	میخک خزری	He	End	P	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	-	-
	<i>Silene viscosa</i>	سیلن چسبناک	He	ES- IT	P	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	-	-
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	سلمه تره	Th	Cos	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	پیچک صحرایی	He	SCO	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Calystegia sepium</i>	پیچک جنگلی	Cr	ES,IT,M	P	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	-	*
	<i>Ipomoea purpurea</i>	نیلوفر یکساله	Th	PL	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*

ادامه جدول ۲

تیره	نام علمى	نام فارسى	شکل زیستى	کروتیپ	طول عمر	گروه گیاهى	پراکنش (ارتفاع از سطح دریا)	مصارف علفه اى	مصارف داروبى
Cornaceae	<i>Cornus australis</i>	سیاه ال	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	*
Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i>	زربین	Ph	ES	P	GYM	<۱۰۰	-	*
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i>	سرخس عقابى	Cr	Cos	A	PT	۱۰۰-۵۰۰	-	*
Ebenaceae	<i>Diospyros lotus</i>	خرمالوى وحشى	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	*
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i>	شیر سگ	Th	ES-IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Equisetaceae	<i>Equisetum ramosissimum</i>	دم اسب	Ch	ES-IT	P	PT	<۱۰۰	-	*
Fagaceae	<i>Quercus castaneifolia</i>	بلند مازو	Ph	End	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
Hamamelidaceae	<i>Parrotia persica</i>	انجیلی	Ph	End	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	*	*
Iridaceae	<i>Iris germanica</i>	زنبق	Cr	ES-IT	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	-	*
Ixioliriaceae	<i>Ixiolirion tataricum</i>	خیارک	Cr	PL	A	Angi(Mono)	۱۰۰-۵۰۰	-	*
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i>	گردو	Ph	ES,IT,M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>pterocarya fraxinifolia</i>	لرک	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	-
Juncaceae	<i>Juncus acutus</i>	سازو نوک تیز	Cr	ES-M	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
Lamiaceae	<i>Stachys byzantina</i>	سنبله نقره اى	He	ES	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Mentha longifolia.L</i>	پونه	He	PL	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Thymus kotschyanus</i>	آویشن	Ch	IT	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Zizphora clinopodioides</i>	کاکوتى	Ch	IT	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Stachys lavandulifolia</i>	چای چوبان	He	IT	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Lamium album</i>	گزنه سفید	He	ES-IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Mentha pulegium</i>	پونه معطر	He	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Mentha spicata</i>	پونه سنبله اى	He	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Mentha aquatica</i>	سونسبر	He	ES-M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Teucrium polium</i>	کلپوره	He	IT-M	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Melissa Officinalis</i>	بادرنجبویه	He	IT-M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*

ادامه جدول ۲

تیره	نام علمی	نام فارسی	شکل زیستی	کروتیپ	طول عمر	گروه گیاهی	پراکنش (ارتفاع از سطح دریا)	مصارف علوفه ای	مصارف دارویی
Leguminosae	<i>Gleditschia caspica</i> .Desf	لیلکی	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	*	*
	<i>Albiza julibrissin</i> .Dar azz	ابریشم	Ph	End	P	Angi(Dico)	۵۰۰-۱۰۰	*	*
	<i>Vicia cracca</i>	ماشک کلاغی	He	ES	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
	<i>Medicago sativa</i>	یونجه	He	PL	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
	<i>Trifolium pratense</i>	شبدر قرمز	He	ES, IT, M	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
	<i>Trifolium repense</i>	شبدر سفید	Cr	ES, IT, M	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
	<i>Lathyrus pratensis</i>	خلر زرد	Cr	ES-IT	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
Liliaceae	<i>Allium paradoxum</i>	پیاز زنگوله ای	Cr	IT	A	Angi(Mono)	>۵۰۰	-	*
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	پنیرک قرمز	He	IT, M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Malva neglecta</i> Wallr	پنیرک	Th	ES, IT, M	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Alcea lenkoranica</i>	گل ختمی	He	ES-IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Tilia platyphyllos</i>	نمدار	Ph	End	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
Moraceae	<i>Morus alba</i>	توت سفید	Ph	ES-IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Morus nigra</i>	توت سیاه	Ph	ES-IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Ficus carica</i>	انجیر	Ph	ES, IT, M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i>	لاله عباسی	He	ES	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	-
Oleaceae	<i>Fraxinus syriaca</i>	زبان گنجشک	Ph	ES, M	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
	<i>Jasminum mesnyi</i>	یاس ژاپنی	Ph	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	-
	<i>Ligustrum vulgare</i>	برگ نو	Ph	ES, IT, M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	شبدر ترشک	He	PL	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Plantago psyllium</i>	اسفرزه	He	PL	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Palantaginaceae	<i>Plantago major</i>	بارهنک	He	PL	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Papaveraceae	<i>Papaver chelidoniifolium</i>	کبیر شقایق مامیرانی	Th	End	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*

ادامه جدول ۲

تیره	نام علمى	نام فارسى	شکل زیستى	کروتنیپ	طول عمر	گروه گیاهى	پراکنش (ارتفاع از سطح دریا)	مصارف علوفه اى	مصارف داروى
Poaceae	<i>Bromus tomentellus</i>	جاروعلف ى	He	PL	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
	<i>Lophochloa phleoides</i>	علف مویى	Th	ES,IT	A	Angi(Mono)	>۵۰۰	*	-
	<i>Phalaris minor Retz.</i>	علف قنارى	Th	IT	A	Angi(Mono)	>۵۰۰	*	-
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	چمن جاروى جنگلى	He	PL	P	Angi(Mono)	-۵۰۰ ۱۰۰	*	-
	<i>Avena fatua</i>	یولاف	Th	ES,IT	A	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	*
	<i>Sorghum halepense</i>	چائیر	He	PL	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	-	*
	<i>Stipa barbata Michx</i>	استیپا	He	IT	P	Angi(Mono)	>۵۰۰	*	-
	<i>Poa pratensis</i>	چمن چند ساله	He	PL	P	Angi(Mono)	>۵۰۰	*	-
	<i>Poa annua</i>	چمن یک ساله	Th	COS	A	Angi(Mono)	>۵۰۰	*	-
	<i>Festuca ovina</i>	علف بره	He	PL	P	Angi(Mono)	>۵۰۰	*	-
	<i>Alopecurus myosuroides</i>	دم‌روباهى	Th	PL	A	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
	<i>Dactylis glomerata</i>	علف باغ	Cr	PL	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
	<i>Cynodon dactylon</i>	مرغ	Cr	IT	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	-	*
	<i>Echinochloa crus-galli</i>	سوروف	Th	Cos	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
	<i>Lolium rigidum</i>	چچم	Th	Cos	A	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
	<i>Stipa capensis</i>	استیپا سوزنى	He	ES, IT	D	Angi(Mono)	>۵۰۰	-	-
	<i>Paspalum paspaloides</i>	پاسپالوم	He	Cos	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
	<i>Paspalum dilatatum</i>	ارزن باتلاقى	He	Cos	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
	<i>Phragmites australis</i>	نى	Cr	PL	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	-	*
	<i>Setaria viridis</i>	گاورس	Th	ES, IT	A	Angi(Mono)	>۵۰۰	*	-
	<i>Aegilops tauschii</i>	دانه تسبیح	Th	IT	A	Angi(Mono)	<۱۰۰	*	-
	<i>Koeleria cristata</i>	کلریا	He	ES	P	Angi(Mono)	>۵۰۰	*	-
	<i>Melica uniflora albida</i>	ملیکا جنگلى	Cr	ES,IT	P	Angi(Mono)	-۵۰۰ ۱۰۰	*	-

ادامه جدول ۲


تیره	نام علمی	نام فارسی	شکل زیستی	کرو تیپ	طول عمر	گروه گیاهی	پراکنش (ارتفاع از سطح دریا)	مصارف علفه ای	مصارف دارویی
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i>	ترشک	He	Cos	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Polygonum convolvulus</i>	علف هفت بند	Th	Cos	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	-
Pteridaceae	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	پرسیاوشان	Cr	Cos	P	PT	۱۰۰ - ۵۰۰	-	*
	<i>Pteris cretica</i>	سرخس دو پایه	Cr	ES	P	PT	۱۰۰ - ۵۰۰	-	*
Primulaceae	<i>Primula heterochroma</i>	پامچال	He	End	A	Angi(Dico)	۱۰۰ - ۵۰۰	-	-
	<i>Stapf Cyclamen coum</i>	نگونسار	Cr	ES	A	Angi(Dico)	۱۰۰ - ۵۰۰	-	-
	<i>Miller Anagallis arvensis</i>	جنگلی آناگالیس	Th	PL	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
		قرمز							
Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i>	سیاه توسه	Ph	ES	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	*
Rosaceae	<i>Miller Sanguisorba minor</i>	توت روباهی	He	ES, IT, M	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Potentilla reptans</i>	پنجه برگ رونده	He	ES-M	P	Angi(Dico)	۱۰۰ - ۵۰۰	*	*
	<i>Rubus hyrcanus</i>	تمشک خزری	Ch	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Rubus caesius</i>	تمشک کبود	Ch	ES, IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Rubus persicus</i>	تمشک ایرانی	Ch	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰ - ۵۰۰	*	*
	<i>Laurocerasus officinalis</i>	جل	Ph	ES, M	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
	<i>Rosa canina</i>	نسترن وحشی	Ph	ES, IT, M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Prunus divaricate</i>	آلوچه	Ph	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Prunus spinosa</i>	آلو	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰ - ۵۰۰	-	*
	<i>Eriobotrya japonica</i>	ازگیل ژاپنی	Ph	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Cydonia oblonga</i>	به جنگلی	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰ - ۵۰۰	-	*
	<i>Crataegus elbursensis</i>	سیاه ولیک	Ph	ES	P	Angi(Dico)	۱۰۰ - ۵۰۰	-	*
	<i>Crataegus microphylla</i>	سرخ ولیک	Ph	ES, IT	P	Angi(Dico)	۱۰۰ - ۵۰۰	-	*
	<i>Punica granatum</i>	انار ترش	Ph	ES, IT	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Mespilus germanica</i>	ازگیل وحشی	Ph	ES, IT, M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Pyrus hyrcana Fedor</i>	گلایی خزری	Ph	End	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*

ادامه جدول ۲


تیره	نام علمی	نام فارسی	شکل زیستی	کروتیپ	طول عمر	گروه گیاهی	پراکنش (ارتفاع از سطح دریا)	مصارف علوفه ای	مصارف دارویی
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	صنوبر	Ph	PL	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	-
	<i>Populus alba</i>	سپیدار	Ph	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Populus caspica</i>	سفید پلت	Ph	End	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	-
Santalaceae	<i>Viscum album</i>	دارواش	Ph	PL	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	*	*
Sapindaceae	<i>Acer velutinum</i>	پلت	Ph	End	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	*	*
Scrophulariaceae	<i>Rhynchocorys maxima</i>	سر فیلی	Cr	End	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Verbascum stachydiforme</i>	گل ماهور سنبله ای	He	ES,IT	P	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	*
	<i>Veronica persica</i>	سیزاب ایرانی	Th	IT	A	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Smilacaceae	<i>Smilax excelsa</i>	ازملک	Ph	ES-IT	P	Angi(Mono)	۱۰۰-۵۰۰	*	*
Solanaceae	<i>Datura innoxia</i>	تاتوره علفی	Th	Cos	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	لوئی	Cr	ES	P	Angi(Mono)	<۱۰۰	-	*
Ulmaceae	<i>Zelkova carpinifolia</i>	آزاد	Ph	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	-
	<i>Celtis australis</i>	داغداغان	Ph	ES-M	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	*	*
	<i>Ulmus minor</i>	اوجا	Ph	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Ulmus glabra Hudson</i>	ملج	Ph	ES	P	Angi(Dico)	>۵۰۰	-	-
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	گزنه دوپایه	He	ES	P	Angi(Dico)	<۱۰۰	-	*
	<i>Viola odorata</i>	بنفشه معطر	He	ES-M	A	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	*
Violaceae	<i>Viola alba Besser</i>	بنفشه سفید	He	ES	A	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	*
	<i>Viola sieheana</i>	بنفشه خزری	He	ES	A	Angi(Dico)	۱۰۰-۵۰۰	-	*

جدول ۳ - وضعیت حفاظتی گونه‌های شناسایی شده در منطقه‌ی خرارود
EN: گیاهان در معرض انقراض، VU: گیاهان آسیب پذیر، LR: گیاهان نسبتاً آسیب پذیر


وضعیت گونه	نام گونه
EN	<i>Dianthus hyrcanicus</i> (Caryophyllaceae)
VU	<i>Ziziphora clinopodioides</i> (Lamiaceae), <i>Frangula alnus</i> Miller (Rhamnaceae), <i>Verbascum stachydiforme</i> (Scrophulariaceae)
LR	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Poaceae), <i>Trifolium pretense</i> (Leguminosae), <i>Trifolium repens</i> (Leguminosae), <i>Achillea millefolium</i> (Asteraceae), <i>Thymus kotschyanus</i> (Lamiaceae), <i>Fraxinus syriaca</i> (Oleaceae), <i>Malva neglecta</i> (Malvaceae), <i>Parrotia persica</i> (Hamamelidaceae), <i>Mentha longifolia</i> (Lamiaceae), <i>Primula heterochroma</i> (Primulaceae), <i>Tilia platyphyllos</i> (Malvaceae), <i>Buxus hyrcana</i> (Buxaceae), <i>Pyrus hyrcana Fedor</i> (Rosaceae).
انحصاری یا بومی	<i>Centaurea hyrcanica</i> (Asteraceae), <i>Pyrus hyrcana Fedor</i> (Rosaceae), <i>Primula heterochroma</i> (Primulaceae), <i>Buxus hyrcana</i> (Buxaceae), <i>Parrotia persica</i> (Hamamelidaceae), <i>Acer velutinum</i> (Sapindaceae), <i>Papaver chelidoniifolium</i> Boiss& Buhse (Papaveraceae), <i>Quercus castaneifolia</i> (Fagaceae), <i>Dianthus hyrcanicus</i> (Caryophyllaceae), <i>Tilia platyphyllos</i> (Malvaceae), <i>Rhynchocorys maxima</i> (Scrophulariaceae), <i>casica</i> (Salicaceae), <i>Ruscus hyrcanus</i> (Asparagaceae), <i>Albiza julibrissin</i> (Leguminosae).



شکل ۱۰- دهستان خرارود - روستای جنگلی اشکراب (عکس گرفته شده توسط مائده امیدی نوییچار در سال ۱۴۰۱)



شكل ۱۱- پوشش گیاهی دهستان خرارود- الف) شقایق مامیرانی (*Papaver chelidoniifolium*) ب) لوتی (*Typha angustifolia*)
پ) پونه معطر (*Mentha pulegium* L.) د) نگونسار جنگلی (*Cyclamen coum* Miller) (عکس گرفته شده توسط مأنده امیدى
نوبیجار در سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۱)



شكل ۱۲- پوشش گیاهی دهستان خرارود: الف) کوله خاس (*Ruscus hyrcanus*) ب) تمشک کبود (*Rubus caesius*) پ) سرفیلی
د) پامچال (*Primula heterochroma*) (عکس گرفته شده توسط مأنده امیدى نوبىجار در سال‌های
۱۴۰۲-۱۴۰۱)



شکل ۱۳- پوشش گیاهی دهستان خرابود: الف) لیلکی (*Gleditsia caspica* Desf) ب) پلت (*Acer velutinum*) پ) داغداغان (*Celtis australis* L) د) آزاد (*Zelkova carpinifolia*) (عکس گرفته شده توسط مانده امیددی نوبیجار در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲)

بحث و نتیجه‌گیری

مدیریت منابع طبیعی مستلزم شناخت کامل و جامع از پوشش گیاهی رویشگاه‌های مختلف و پیش‌بینی چگونگی تحول پوشش گیاهی آن است (سلیمان‌پور و حاتمی، ۱۳۹۹). این شناسایی علمی یعنی تعیین فهرست فلورستیک، طیف زیستی و انتشار جغرافیایی گونه‌های گیاهی از نظر شناخت تنوع زیستی، تعیین پتانسیل قابلیت‌های رویشی، شناسایی گونه‌های مقاوم، در حال انقراض حائز اهمیت است (مولائی شام اسبی و همکاران، ۱۴۰۰؛ آزادبخت و قهرمانی نژاد، ۱۴۰۲) و پس از آن می‌توان به مدیریت صحیح و اجرایی در زمینه حفظ مرتع و جنگل، جلوگیری از چرای بی‌رویه دام، توسعه کشاورزی و صنایع وابسته به آن از جمله داروسازی و گردشگری و در نهایت اشتغال‌زایی مبادرت ورزید (جعفری و همکاران، ۱۴۰۲). فلور ایران به علت وسعت، تنوع شرایط اقلیمی و توپوگرافی آن بسیار غنی است (یاری و همکاران، ۱۳۹۷) و علیرغم مطالعات انجام‌گرفته، شناسایی بیشتر روابط، سیمای روشن‌تری از انتشار گونه‌ها را ارائه می‌دهد (نوریاغدی و همکاران، ۱۳۹۹).

دهستان خرابود به دلیل برخورداری از شرایط مطلوب اکولوژیکی از نقطه‌نظر بارندگی و داشتن خاک مساعد دارای

تنوع گیاهی بالایی است؛ به‌طوری‌که در منطقه ۱۵۷ گونه گیاهی از ۱۳۶ جنس و ۵۶ تیره گیاهی شناسایی شدند. خانواده‌های Poaceae، Rosaceae، Asteraceae و Lamiaceae به ترتیب بزرگ‌ترین تیره‌های گیاهی منطقه محسوب می‌شود و دلیل اصلی آن سازگاری بیشتر این گیاهان و شکل زیستی آن‌ها با شرایط اکولوژیکی منطقه است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که غالب گونه‌های موجود چندساله و دائمی هستند که نشان‌دهنده سازگاری آن‌ها به شرایط آب و هوایی و اداپتیکی است. مقایسه این بررسی با سایر مطالعات نشان می‌دهد که تیره‌های مذکور در استان‌های شمالی کشور تیره‌های غالب گیاهی است و با مطالعه فلور در دیگر نواحی هیرکانی مطابقت دارد (آتشگاهی و همکاران، ۱۳۸۸؛ قلی‌پور و همکاران، ۱۳۹۶؛ نوریاغدی و همکاران، ۱۳۹۹؛ رحمانی‌راد و همکاران؛ ۱۴۰۳). نوریاغدی و همکاران (۱۳۹۹)، سلیمان‌پور و حاتمی (۱۳۹۹) و مولائی شام اسبی و همکاران (۱۴۰۰) در پژوهش خود بیان داشتند که قرارگیری تیره گندمیان در میان تیره‌های بزرگ گیاهی منطقه ممکن است به دلیل قرارگیری جوانه‌ی انتهایی گونه‌های گیاهی این تیره در سطح خاک و ممانعت بیشتر از صدمات ناشی از چرای دام باشد. علت فراوانی نسبی تیره

و سازگارى گياهان با سرما است. رحمانى راد و همكاران (۱۴۰۳) در بررسى حوزه‌ى آبخيز توتكابين- داماش بيشترين شكل زيستى را همى كريپتوفيت دانستند و افزودند نواحى كوهستانى به دليل تنوع در شرايط كليماتيكي، ادافيكي، توپوگرافى و در نهايت اكولوژيكي، زيستگاه‌هاى متعددى را پديد آورده‌اند و هر يك آشان اكولوژيكي مناسبى را براى جذب گونه‌هاى گياهى ايجاد مى‌كنند كه مجموعه اين شرايط سبب ايجاد تنوع بالا در فلور نواحى كوهستانى مى‌گردد. در مطالعه‌ى نوروزى هارونى و باده‌يان (۱۳۹۵) در منطقه‌ى شفت بيشترين درصد فراوانى طيف زيستى به همى كريپتوفيت‌ها و سپس به فانروفيت‌ها تعلق داشت. اين موضوع بيانگر وجود يك اقليم معتدل با زمستان‌هاى سرد اما با بارندگى فروان و تابستان‌هاى نسبتاً خنك و مناسب براى رويشگاه‌هاى جنگلى است كه در آن فانروفيت‌ها حضور چشمگيرى دارند. همچنين بالا بودن درصد فروانى فانروفيت‌ها را مى‌توان به توسعه نيافتن گونه‌هاى علفى و بوته‌اى در زير تاج پوشش درختان و درختچه‌ها نيز نسبت داد. در همين راستا آخوندنژاد و همكاران (۱۳۹۵) در مطالعات خود در شهرستان نور بيان داشتند كه سهم زياد فانروفيت‌ها سازگارى مطلوب اين شكل زيستى به بارندگى، شرايط خاك و سطح ايستابى بالا را نشان مى‌دهد. از يك سو بارندگى زياد شرايط را براى استقرار همى كريپتوفيت‌ها مناسب‌تر كرده و از سوي ديگر ارتفاعات البرز و دريافت رطوبت زياد از سمت دريائى كاسپين و ظرفيت گرمائى ويژه آن و تقابل هم‌زمان و هم‌سوى آن‌ها غنائى گونه‌اى فانروفيت‌ها را افزايش داده‌اند. رضوى و حسن عباسى (۱۳۹۱) اظهار نمودند كه فانروفيت‌ها و همى كريپتوفيت‌ها نقش بسيار تعيين‌كننده‌اى در تثبيت خاك، به‌ويژه در نواحى شيب‌دار و كوهستانى بر عهده‌دارند و در واقع پناهگاهى براى استقرار ساير عناصر زيستى فراهم مى‌كنند. سومين شكل رويشى غالب منطقه تروفيت است. آخوندنژاد و همكاران (۱۳۹۵)، در مطالعات خود بيان داشتند كه اگرچه تروفيت‌ها در مناطق بيابانى فراوانى زيادى دارند. حضور نسبتاً زياد اين شكل زيستى در ساير مناطق آثار دخالت‌هاى انسانى و چراى دام را نشان مى‌دهد. همچنين نوروزى هارونى و باده‌يان (۱۳۹۵) افزودند كه بالا بودن درصد فراوانى تروفيت‌ها را مى‌توان به دليل تخریب شديد ناشى از استفاده جنگل‌نشينان، عمليات جاده‌سازى و جمع‌آورى گياهان توسط مردمان محلى دانست. تروفيت‌ها

كاسنى نيز سازش‌پذيرى به شرايط سخت كوهستانى، توانايى فوق‌العاده در ايجاد و انتشار بذرهاى كوچك، خوش‌خوراكى پايين براى دام و ساختار ريخت‌شناسى متنوع نظير وجود اندام‌هاى خاردار به‌ويژه در برگ براى زيست در اقليم‌هاى متفاوت است. همچنين گياهان تيره نعنائيان به دليل داشتن اسانس معطر عمدتاً مورد چراى دام قرار نمى‌گيرند.

شكل زيستى گياهان در اقليم‌هاى مختلف باهم متفاوت و طيف بيولوژيكي مخصوص خود دارد. اين مشخصه صرف‌نظر از ويژگى‌هاى تاكسونوميكي، سازش گياهان با شرايط محيطى را نشان مى‌دهد. در واقع تشابه ساختارى و شكل زيستى گياهان يك منطقه نشان‌دهنده‌ى ايجاد نوعى تعادل براى بهره‌گيرى از منابع موجود در آن رويشگاه است (آتشگاهى و همكاران، ۱۳۸۸؛ نوروزى هارونى و باده‌يان، ۱۳۹۵؛ آخوندنژاد و همكاران، ۱۳۹۵؛ قلى‌پور و همكاران، ۱۳۹۶؛ نورياغدى و همكاران، ۱۳۹۹؛ سليمان‌پور و حاتمى، ۱۳۹۹؛ مولائى شام اسبى و همكاران، ۱۴۰۰؛ مفيدنژاد و همكاران، ۱۴۰۲؛ اسدى و همكاران، ۱۴۰۲؛ رحمانى راد و همكاران، ۱۴۰۳). اقليم منطقه مورد مطالعه بسيار مرطوب معتدل و بسيار مرطوب سرد و شكل زيستى غالب همى كريپتوفيت و فانروفيت است كه به دليل سازگارى بيشتر با محيط است. درصد حضور بالا همى كريپتوفيت‌ها به دليل سپرى نمودن فصل سرما توسط جواهرهاى تجديد‌كننده حيات در اين گونه از گياهان در سطح خاك و در ميان لاشبرگ‌ها و برف‌هاى زمستانى مى‌باشد و در تقسيم‌بندى‌هاى اقليمى رانكاير، همى كريپتوفيت‌ها در مناطق معتدله غالب هستند. همچنين بررسى در بين كمربندهاى ارتفاعى نشان‌دهنده‌ى كاهش فانروفيت‌ها و تروفيت‌ها و افزايش همى كريپتوفيت‌ها در ارتفاع بالاتر است كه به تغييرات دمائى مرتبط است. مولائى شام اسبى و همكاران (۱۴۰۰) در تحقيق خود بيان داشتند كه ارتفاع نماينده تركيبى پيچيده از متغيرهاى اقليمى است و ارتباط نزديكى با تعدادى از ويژگى‌هاى محيطى مانند بافت و مواد مغذى خاك دارد. قلى‌پور و همكاران (۱۳۹۶) در مطالعه تنوع گياهى در شهرستان نكا بيشترين شكل زيستى را همى كريپتوفيت و فانروفيت دانستند. مفيدنژاد و همكاران (۱۴۰۲) فراوان‌ترين شكل زيستى منطقه لنگرود را همى كريپتوفيت برشمردند و افزودند درصد بالائى اين شكل زيستى نشان‌دهنده‌ى يكنواختى شرايط اقليمى و ادافيكى

باده‌یان، ۱۳۹۵؛ آخوندنژاد و همکاران، ۱۳۹۵؛ نوریاغدی و همکاران، ۱۳۹۹؛ سلیمان‌پور و حاتمی، ۱۳۹۹).

گیاهان علوفه‌ای و دارویی منطقه به ترتیب ۳۳ و ۸۲ درصد از کل فلور منطقه تشکیل می‌دهند. استفاده بهینه از منابع طبیعی به‌منظور استفاده در زمینه‌ی پرورش دام و گیاهان دارویی نیازمند شناخت از وضعیت کمی و کیفی آن‌ها دارد. در این منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی هر بخش (جلگه یا کوهپایه)، دامداران از دام و منابع تغذیه‌ای متنوعی بهره‌برداری می‌کنند. ارزش غذایی یک‌گونه‌ی علوفه‌ای با توانایی آن در تأمین طیف وسیعی از مواد مغذی مورد نیاز حیوانات برای نگهداری، رشد و تولیدمثل تعیین می‌شود و با ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و عوامل ضد تغذیه‌ای مرتبط است. در مناطق کوهپایه‌ای در فصول سرد سال، برگ‌ها و بوته‌های درختان خوش‌خوراک مثل ابریشم، لیلکی، توت، بلندمازو، پلت، خاس و همیشه‌کاربرد دارند. این درختان دارایی‌های چندمنظوره در نظام‌های دامداری شرق گیلان و منبع خوبی برای علوفه تازه و خشک در طول فصول سرد و بحرانی سال است. همچنین با توجه به توان بالقوه منطقه در زمینه‌ی گیاهان دارویی چون پونه معطر، گزنه، شوند، بومادران، بابونه و سیاه‌ولیک، با شناخت گونه‌های گیاهی و دستیابی به اطلاعات لازم در مورد مکان‌های رویش آن‌ها، گام اساسی برای استفاده از مواد مؤثره و ترویج شیوه‌های اصولی بهره‌برداری برداشته می‌شود. در همین زمینه، مفیدنژاد و همکاران (۱۴۰۲) بیان داشتند که بسیاری از گیاهان شناسایی شده به لحاظ خواص درمانی و خوراکی از اهمیت فراوانی نزد اهالی منطقه برخوردارند؛ به طوری که پرورش آن‌ها موجب بازدهی اقتصادی و افزایش توان تاب‌آوری اقتصادی ساکنین این مناطق خواهد شد. فراوانی تیره‌های Rosaceae، Asteraceae و Lamiaceae که از مهم‌ترین گیاهان اسانس‌دار منطقه به شمار می‌روند، اهمیت حفظ این ذخایر ژنتیکی، ممانعت از تخریب و توجه به توسعه و پرورش آن‌ها را دو چندان می‌کند.

مشخص نمودن سطح تهدید پذیری گونه‌های گیاهی برای ارزیابی وضعیت حفاظتی آن‌ها اهمیت دارد (نوریاغدی و همکاران، ۱۳۹۹). در منطقه‌ی مورد مطالعه ۱۴ گونه بومی وجود دارد. گیاهان انحصاری، ذخایر ژنتیکی ارزشمند هر منطقه محسوب می‌شوند و به دلیل دارا بودن صفات ریخت‌شناسی مطلوب، مقامت به آفات و سازگاری به شرایط

با مکانیسم گریز از خشکی، چرخه زندگی خود را در شرایط مناسب رطوبتی کامل و در دوره خشکی را در خواب بذر می‌گذرانند (صلاحی و همکاران، ۱۳۹۳؛ مولائی شام اسبی و همکاران، ۱۴۰۰؛ اسدی و همکاران، ۱۴۰۲؛ رحمانی‌راد و همکاران، ۱۴۰۳).

پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهی یک منطقه نشان‌دهنده تأثیرپذیری آن‌ها از ناحیه یا نواحی رویشی مختلف است. بیشتر گونه‌ها منطقه مربوط به ناحیه ارو-سیبری، ناحیه ارو-سیبری، ایران-تورانی و مدیترانه‌ای و چند ناحیه‌ای هستند. قلی‌پور و همکاران (۱۳۹۶) در مطالعه خود بیشترین پراکندگی جغرافیایی را ناحیه رویشی ارو-سیبری و چند ناحیه‌ای برشمردند. رحمانی‌راد و همکاران (۱۴۰۳) در بررسی خود اظهار کردند که عناصر چند ناحیه‌ای و اروپا سیبری در منطقه حضور غالب داشتند. نوروزی هارونی و باده‌یان (۱۳۹۵) و آخوند نژاد و همکاران (۱۳۹۵)، بیان داشتند که با توجه به اینکه جنگل‌های شمال ایران از نظر جغرافیای گیاهی به ایالت اکسین-هیرکانی از زیر حوزه پونتیک از ناحیه رویشی بزرگ اروپا-سیبری تعلق دارند؛ حضور گونه‌های متعلق به این طیف جغرافیایی در فلور این مناطق دور از انتظار نیست و حضور زیاد گونه‌هایی با پراکنش اروپا-سیبری ارتباط فلورستیک جنگل‌های شمال را با جنگل‌های اروپا-سیبری آشکار می‌کند. در همین زمینه آزادبخت و قهرمانی نژاد (۱۴۰۲) در پژوهش خود اشاره داشتند که جنگل هیرکانی یک اکوسیستم جنگلی خزان‌پذیر معتدل در کانون تنوع زیستی قفقاز در شمال ایران و میزبان فلور باقیمانده‌ای است که از یخبندان‌های کوتاه‌تر جان سالم به در برده است. این جنگل‌ها متراکم‌ترین منطقه جنگلی در جنوب دریای خزر بوده و اهمیت آن از نظر پوشش، تنوع زیستی و چشم‌انداز در جهان شناخته شده است (Hosseini et al, 2024). رحمانی‌راد و همکاران (۱۴۰۳) اضافه نمودند که در مورد عناصر چند ناحیه‌ای تعیین خاستگاه دشوار است. همواره بین فلور هر ناحیه و شرایط اقلیمی فعلی آن تطابق کاملی وجود ندارد؛ زیرا به‌شدت متأثر از دگرگونی‌های دوران زمین‌شناسی گذشته است. حضور گونه‌های دیگر نواحی جغرافیایی می‌تواند نتیجه‌ای از شرایط آب و هوایی مساعد مرطوب، الگوهای طبیعی حضور اتفاقی عناصر گیاهی و حضور گونه‌های مهاجمی است که به دلیل آشفستگی و تخریب به این رویشگاه نفوذ کرده است (نوروزی هارونی و

اکولوژیک از اهمیت خاصی برخوردارند (رحمانی‌راد و همکاران، ۱۴۰۳). در منطقه مورد مطالعه حدود ۱۷ گونه با درجات مختلف آسیب‌پذیری وجود دارد که شامل گونه‌های علفی چندساله و درختی هستند و ممکن است به‌مرور زمان از منطقه حذف شوند. رشد و نمو و تنوع گیاهان تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و ادا فیک است و در طول زمان ویژگی‌های اکولوژیک و دامنه‌ی بردباری معینی نسبت به شرایط محیطی دارند. عواملی چون شیب، میزان بارندگی، چرا دام و دخالت انسان فلور یک منطقه را تغییر می‌دهد که دو عامل آخر گسترش گونه‌های خشبی، خاردار و غیرخوش‌خوارک برای دام و در نهایت کاهش تنوع گونه‌ای را باعث می‌شود (اسدی و همکاران، ۱۴۰۲). جنگل‌های هیرکانی از جمله اکوسیستم‌های در معرض تهدید ایران هستند و ارزیابی تهدید ۴۴ درصد از گونه‌های بومی هیرکانی و نزدیک به اندمیک برای جامعه ملی و بین‌المللی هشداردهنده است. برخی از عوامل اصلی تهدیدکننده جمعیت گونه‌های بومی شامل شهرنشینی و صنعتی شدن، پاک‌سازی اراضی برای مصارف کشاورزی، چرای بی‌رویه دام، جاده‌سازی و سدسازی، آتش‌سوزی، استخراج فشرده، دفع زباله و آلودگی است (Ghorbanalizadeh & Akhani, 2020). در همین راستا آخوندنژاد و همکاران (۱۳۹۵) بیان داشتند که تخریب منطقه در ترکیب فلوریستیکی غیرطبیعی جامعه‌های گیاهی آن مؤثر است. برای مثال حضور گیاهان لیلکی (*Gleditsia caspica*) در جامعه‌های گیاهی، تخریب منطقه به دلیل وجود گاوسرا و حضور دام در جنگل و توان تهاجمی این گونه را نشان می‌دهد. نوروزی هارونی و باده‌یان (۱۳۹۵) اظهار کردند زیست‌بوم طبیعی دربرگیرنده فون و فلور هر کشور است و غنای گونه‌ای با شدت چرای دام و فعالیت‌های سنتی جنگل‌نشینان رابطه تنگاتنگ دارد. مطالعات رحمانی‌راد و همکاران (۱۴۰۳)، افزود حضور گونه‌های نادر، درخطر انقراض و انحصاری در لیست گونه‌های شناسایی‌شده با توجه به ارزش ویژه حفظ ذخایر ژنی در زیستگاه‌های طبیعی، لزوم حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منطقه را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند. در دهه‌های اخیر، تغییرات گسترده‌ای در توزیع جنگل‌ها در شمال ایران رخ داده است. میزان پوشش جنگلی در استان گیلان برابر با ۴۸۵۴۳ هکتار و نرخ کاهش مساحت جنگل در کل محدوده جنگل‌های هیرکانی ۰/۷۴ درصد است که نشان دهنده‌ی افزایش نرخ جنگل‌زدایی و

تبدیل آن به سایر کاربری‌های اراضی است (Hosseini et al, 2024). در همین راستا اطلاعات پژوهش‌های فلوریستی از اهمیت حیاتی در برنامه‌ریزی راهبردهای حفاظتی برخوردار است (Wagensommer, 2023). تغییر کاربری اراضی جنگل‌های هیرکانی باعث کاهش میزان مواد آلی و مغذی خاک و تخریب ساختار خاک شده و یکی از عوامل مؤثر در افزایش میزان رواناب سطحی، سیل و افزایش میزان فرسایش خاک در ایران محسوب می‌شود. افزایش قیمت مسکن و ناتوانی افراد کم‌درآمد حاشیه جنگل در خرید آن یکی دیگر از پیامدهای تغییر کاربری اراضی است. جنگل‌های هیرکانی به عنوان یک قطب مهم در توسعه گردشگری مطرح می‌باشند. تغییر کاربری از جمله گسترش خرید زمین در حاشیه این جنگل‌ها توسط افراد غیربومی و تشدید تمایل به ساخت و ساز، باعث افزایش قیمت مسکن و تغییر کاربری اراضی جنگلی به مسکونی شده است (Hosseini et al, 2024). چنانچه برای حل این معضلات برنامه‌ریزی اصولی با در نظر گرفتن شرایط زیست‌بوم صورت نگیرد؛ تخریب کامل اکوسیستم دور از انتظار نیست (نوروزی هارونی و باده‌یان، ۱۳۹۵).

یکی از پیش‌نیازهای اساسی در دستیابی به توسعه پایدار عرصه‌های طبیعی، شناسایی توانایی‌های بالفعل و بالقوه آن است. با در نظر گرفتن عملکرد و خدمات بی‌شمار اکوسیستم‌های طبیعی جلوگیری از برداشت غیرمجاز و تغییر کاربری یکی از اهداف اصلی مدیریت است. در همین راستا، اقداماتی نظیر بهبود قوانین موجود یا وضع قوانین جدید حفاظتی، تخصیص بودجه اختصاصی، اجرای برنامه‌های مدل‌سازی زیست‌محیطی برای ارزیابی و پیش‌بینی روند تغییرات، پایش دقیق و مستمر با استقرار پلات‌های دائمی، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی و مقابله، کنترل و مهار، استفاده از سنجش‌ازدور، اصلاح بیولوژیک با جانشینی طبیعی یعنی گیاهان بومی با سازگاری بالا، تهیه‌ی محتوی رسانه‌ای برای معرفی گونه‌های گیاهی منطقه به‌منظور رونق صنعت اکوتوریسم، آشنایی مردم محلی با اثرات حفظ محیط‌زیست، آموزش و جلب مشارکت برای رفع اثرهای سوء دخالت‌های انسانی در مناطق حفاظت‌شده، افزایش درآمد جوامع حاشیه جنگل‌ها با اتخاذ سیاست‌های مناسب توزیع ثروت، ارائه تسهیلات مالی با بهره کم و دوره بازپرداخت طولانی‌مدت جهت

جلوگیری از حذف، انقراض و حفظ تنوع و سلامت اکوسیستم‌ها ضروری است.

منابع

- آتشگاهی، ز.، اجتهادی، ح.، زارع، ح. ۱۳۸۸. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگل‌های شرق دودانگه ساری، استان مازندران، پژوهش‌های جانوری (زیست شناسی ایران): ۲۲(۲): ۱۹۳-۲۰۳.
- آخوند نژاد، س.، عصری، ی.، خاکپور مقدم، ط. ۱۳۹۵. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه‌های انجیلی (مطالعه موردی: منطقه ایزده نور). تاکسونومی و بیوسیستماتیک، ۸ (۲۹): ۱۰۳-۱۲۰.
- آزادبخت، م.، قهرمانی نژاد، ف. ۱۴۰۲. بررسی فلور منطقه حفاظت‌شده هزارجریب (واقع در استان‌های مازندران و سمنان)، تاکسونومی و بیوسیستماتیک، ۱۵ (۵۵): ۳۵-۵۲.
- اسدی بربریها، ا.، جعفری، ا.، قاسم‌زاده، ف. ۱۴۰۲. مطالعه فلوریستیک پنج روستای دهستان آلاداغ در شهرستان بجنورد. یافته‌های نوین در علوم زیستی، ۱۰ (۱): ۹۸-۸۱.
- اکبرزاده، ع.، جایمند، ک.، خانجانی شیراز، ب.، همتی، ا. ۱۳۸۹. گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آن‌ها، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۳: ۳۴۷-۳۲۶.
- امیری، م.ص.، جبار زاده، پ. ۱۳۸۹. مطالعه فلوریستیک حوزه آبخیز زنگلانلو (استان خراسان رضوی)، تاکسونومی و بیوسیستماتیک: ۲(۵): ۱-۱۶.
- بخشنده ناورود، ب.، ابراری واجاری، ک.، پیلهور، ب.، کوچ، ی. ۱۳۹۵. مطالعه فلوریستیک گیاهان آشکوب علفی جنگل‌های راش هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل راش ناو اسالم، حفاظت زیست‌بوم گیاهان، ۴(۹): ۱۳۲-۱۱۵.
- توکل، م. ۱۳۸۷. فنولوژی و استقرار گیاهان دارویی و معطر در باغ گیاهشناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران. ۱۲۴ صفحه.
- حسینی، س. ع. ۱۳۹۰. معرفی لیست فلوریستیک منطقه سرعی آباد گرگان- ایران، پژوهش‌های علوم گیاهی، شماره پیاپی ۲۴، ۶ (۴): ۲۵-۹.
- صلاحی کجور، ا.، تمرتاش، ر.، طاطیان، م.ر. ۱۳۹۳. بررسی فلوریستیک و شکل زیستی مراتع ییلاقی حوضه نکارود، حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، ۲(۱): ۱۰۲-۹۳.
- رحمانی‌راد خرفکلی، م.ر.، روان‌بخش، م.، حیدری، ق.، علیدوست، ا. ۱۴۰۳. بررسی فلوریستیک حوضه آبخیز توتکابن - داماش، حفاظت زیست‌بوم گیاهان، ۱۲ (۲۴): ۱۷۶-۱۸۸.
- رستم‌پور، م. ۱۳۹۷. مطالعه لیست فلوریستیک و شکل زیستی گیاهان منطقه حفاظت‌شده شاسکوه، خراسان جنوبی، هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتع‌داری ایران.
- رضوی، س. ع.، حسن عباسی، ن.ع. ۱۳۹۱. بررسی فلوریستیک و کورولوژی گیاهان رویشگاه سرو خمره‌ای سورکش فاضل‌آباد - گلستان، پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل، ۲(۱۶): ۱۰۰-۸۳.
- سرشماری نفوس و مسکن. ۱۳۹۵. مرکز آمار ایران، به نشانی اینترنتی: <https://amar.org.ir/statistical-information/statid/52277>
- نقشه توپوگرافی ایران. ۱۴۰۳. توپومپ، به نشانی اینترنتی: <https://www.topomap.ir>
- سلیمان پور، س.م. و حاتمی، ا. ۱۳۹۹. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در غرب آبخیز مهارلو استان فارس، تاکسونومی و بیوسیستماتیک ۱۲(۴۵): ۱-۲۲.
- گروه توسعه هوشناسی کاربردی. ۱۴۰۲. شناسنامه اقلیمی اداره هوشناسی سینوپتیک لاهیجان و دیلمان، سازمان هوشناسی کشور، اداره کل هوشناسی استان گیلان، <https://www.gilmet.ir/fa/>
- عادل، م.ن.، علوی، س.ج.، صالحی، ع.، پوربابائی، ح. ۱۳۹۳. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگل‌های کران‌رودی در حاشیه رودخانه صفارود رامسر در دامنه‌ای ارتفاعی ۳۵۰ تا ۲۴۰۰ متر، جنگل ایران. ۴(۶): ۴۹۹-۵۲۰.
- علیها، م. ۱۳۷۴. معرف گونه‌های سمی مراتع ایران، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، ۶۵ صفحه.

چرا و قرق در منطقه شفت، گیلان. تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، ۷(۲) (پیاپی ۲۴)، ۴۷-۵۹.

نوریاغدی، پ.، پناهی میرزاحسنول، ج.، بهمنش، ب.، بیگ محمدی، م. ۱۳۹۹. مطالعه فلور و معرفی گونه‌های گیاهی در معرض خطر منطقه فارسیان (شهرستان گالیکش، استان گلستان). حفاظت زیست بوم گیاهان؛ ۸ (۱۷): ۱۹۴-۱۷۵

Alsobeai, S.M. 2024. Floristic diversity, life form, and plant life chorology at AL-Fawzan Reserve, Kingdom of Saudi Arabia, Applied Ecology and Environmental Research, 22(4):3709-3726.

Hosseini, S., Amirnejad, H., Azadi, H. 2024. Impacts of Hyrcanian forest ecosystem loss: the case of Northern Iran Environment, Development and Sustainability <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04408-113>

Ghorbanalizadeh, A., Akhane, H. 2020. Plant diversity of Hyrcanian relict forests: An annotated checklist, chorology and threat categories of endemic and near endemic vascular plant species, Plant Diversity, 44 (1) : 39-69.

Raunkiaer, C. 1934. The life forms of plant and statistical plant geography. Clarendon Press Inc., Oxford, 328p

IUCN, 1994. Red list categories. Prepared by species survival commission.

Wagensommer, R.P. 2023. Floristic Studies in the Light of Biodiversity Knowledge and Conservation, Plants, 12, 2973.1-3. <https://doi.org/10.3390/plants12162973>.

Zohary, M. 1973. Geobotanical Foundations of the Middle East, Fischer Verlag, Stuttgart-Amsterdam, 765 pp.

فتح‌الله‌زاده، ط. ۱۳۸۹. جاذبه‌های گردشگری شهرستان سیاهکل و دیلمان گامی در جهت توسعه گردشگری، جغرافیایی سرزمین، ۷(۲۷): ۱۲۷-۱۱۱.

قربانی، ا.، مولائی شام اسبی، م. ۱۳۹۷. بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیای و تنوع در رویشگاه‌های *melanolepis Artemisia* و *aucheri Artemisia* منطقه جنوب شرقی سبلان، حفاظت زیست‌بوم گیاهان، ۶ (۱۳): ۲۲-۱.

قلی‌پور، ع.، رسولی، ن.، قربانی نهوجی، م. ۱۳۹۶. تنوع گیاهی دهستان زارمرو، شهرستان نکا (مازندران)، حفاظت زیست‌بوم گیاهان ۵ (۱): ۱۷۴-۱۵۵.

قهرمان، ا. ۱۳۷۲. فلور رنگی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران.

محرابیان، ا. ر.، نقی نژاد، ع.ر.، مصطفوی، ج.، کیابی، ب.، عبدلی، ا. ۱۳۸۷. بررسی فلور و رویشگاه‌های منطقه حفاظت شد مند (استان بوشهر)، محیط‌شناسی، ۴۶(۳۴): ۱-۱۸.

مظفریان و. ۱۳۹۷. فلور گیلان، رشت، فرهنگ ایلیا، ۱۵۵۶ صفحه.

مظفریان و. ۱۳۹۹. گیاهان دارویی و معطر گیلان، رشت، فرهنگ ایلیا، ۶۳۹ صفحه.

مفیدنژاد، م.، زمانی، ا.، مرادی، ا.، کمالی، ک. ۱۴۰۲. بررسی فلور و شکل زیستی گیاهان دارویی حاشیه جنوبی شهرستان لنگرود، حفاظت زیست بوم گیاهان، ۱۱(۲۲): ۲۴۸-۲۶۴

مولائی شام اسبی م.، معمری، م.، قربانی، ا.، بیدارلرد، م.، دادجو، ف.، صادقی نسب، م.، لطفی، ع. ۱۴۰۰. معرفی فلور، شکل زیستی، کروئوزی و تنوع گیاهی در پروفیل ارتفاعی مراتع قزل‌اوزن- آق‌داق شهرستان خلخال. حفاظت زیست بوم گیاهان. ۹ (۱۸): ۱۹۳-۲۱۸

یاری، ر.، حشمتی، غ.ی.، رفیعی، ج. ۱۳۹۷. معرفی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)، پژوهش‌های گیاهی (زیست‌شناسی ایران)، ۳۱(۳)، ۸۵۳-۸۴۲.

نوائیان، م.، فرید مجتهدی، ن.، قاسمی وسمه جانی، ا. ۱۳۹۸. گالش‌ها، رشت، فرهنگ ایلیا، ۱۸۸ صفحه.

نوروزی هارونی، ن.، باده‌یان، ض. ۱۳۹۵. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در دو عرصه تحت